

(死亡) 第1表 性別にみた死因順位(第10位まで)別 死亡数・死亡率(人口10万対)・構成割合

死 因	平成 23 年			平成 22 年			対前年増減	
	死亡数	死亡率	死亡総数に占める割合 (%)	死亡数	死亡率	死亡総数に占める割合 (%)	死亡数	死亡率
総 数								
全 死 因	2 769	924.3	100.0	2 526	846.7	100.0	243	77.6
悪 性 新 生 物 (1)	833	278.1	30.1	(1) 806	270.2	31.9	27	7.9
心 疾 患 (2)	427	142.5	15.4	(2) 399	133.7	15.8	28	8.8
脳 血 管 疾 患 (3)	359	119.8	13.0	(3) 284	95.2	11.2	75	24.6
肺 炎 (4)	271	90.5	9.8	(4) 231	77.4	9.1	40	13.1
不 慮 の 事 故 (5)	104	34.7	3.8	(5) 73	24.5	2.9	31	10.2
老 衰 (6)	86	28.7	3.1	(7) 62	20.8	2.5	24	7.9
自 殺 (7)	59	19.7	2.1	(6) 68	22.8	2.7	△ 9	△ 3.1
腎 不 全 (8)	56	18.7	2.0	(9) 55	18.4	2.2	1	0.3
糖 尿 病 (9)	47	15.7	1.7	(8) 58	19.4	2.3	△ 11	△ 3.7
肝 疾 患 (10)	39	13	1.4	(12) 27	9.0	1.1	12	4
男								
全 死 因	1 497	1054.3	100.0	1 334	842.3	100.0	163	212
悪 性 新 生 物 (1)	479	337.3	32.0	(1) 469	331.3	35.2	10	6
心 疾 患 (2)	227	159.9	15.2	(2) 195	137.7	14.6	32	22.2
脳 血 管 疾 患 (3)	165	116.2	11.0	(3) 148	104.5	11.1	17	11.7
肺 炎 (4)	140	98.6	9.4	(4) 124	87.6	9.3	16	11
不 慮 の 事 故 (5)	56	39.4	3.7	(7) 32	22.6	2.4	24	16.8
自 殺 (6)	44	31	2.9	(6) 43	30.4	3.2	1	0.6
糖 尿 病 (7)	34	23.9	2.3	(8) 28	19.8	2.1	6	4.1
腎 不 全 (8)	33	23.2	2.2	(9) 26	18.4	1.9	7	4.8
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 (9)	30	21.1	2.0	(10) 25	17.7	1.9	5	3.4
老 衰 (10)	25	17.6	1.7	(12) 17	12.0	1.3	8	5.6
女								
全 死 因	1 272	807.2	100.0	1 192	760.3	100.0	80	46.9
悪 性 新 生 物 (1)	354	224.7	29.7	(1) 337	214.9	28.3	17	9.8
心 疾 患 (2)	200	126.9	16.8	(2) 204	130.1	17.1	△ 4	△ 3.2
脳 血 管 疾 患 (3)	194	123.1	16.3	(3) 136	86.7	11.4	58	36.4
肺 炎 (4)	131	83.1	11.0	(4) 107	68.2	9.0	24	14.9
老 衰 (5)	61	38.7	5.1	(5) 45	28.7	3.8	16	10
不 慮 の 事 故 (6)	48	30.5	4.0	(6) 41	26.2	3.4	7	4.3
腎 不 全 (7)	23	14.6	1.9	(8) 29	18.5	2.4	△ 6	△ 3.9
肝 疾 患 (8)	18	11.4	1.5	(11) 7	4.5	0.6	11	6.9
自 殺 (9)	15	9.5	1.3	(9) 25	15.9	2.1	△ 10	△ 6.4
糖 尿 病 (10)	13	8.3	1.1	(7) 30	19.1	2.5	△ 17	△ 10.8

注：1) ()内の数字は死因順位を示す。

2) 「心疾患」は、「心疾患(高血圧性を除く)」である。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移 (総数)

年齢階級	総 数										対前年増減 (23年-22年)
	昭和55年	60年	平成2年	7年	12年	17年	20年	21年	22年	23年	
	死 亡 数										
総 数	1 080	1 174	1 293	1 690	1 843	2 128	2 501	2 524	2 526	2 769	243
0～4歳	49	13	14	12	5	9	13	18	8	12	4
5～9	9	1	2	3	1	-	1	1	3	2	△ 1
10～14	3	2	-	1	1	-	1	1	4	4	0
15～19	8	4	7	7	5	5	0	3	3	4	1
20～24	8	11	8	6	9	6	7	9	10	9	△ 1
25～29	17	10	5	12	8	7	10	7	6	6	0
30～34	17	7	6	14	12	9	8	8	7	15	8
35～39	19	22	19	19	21	12	13	20	24	22	△ 2
40～44	26	29	23	32	12	33	19	23	24	28	4
45～49	33	45	38	46	37	48	44	47	41	42	1
50～54	45	75	51	70	72	67	67	63	64	59	△ 5
55～59	75	91	76	80	89	101	107	100	98	106	8
60～64	93	78	94	133	108	117	139	119	150	147	△ 3
65～69	118	111	126	193	185	150	188	165	187	178	△ 9
70～74	154	178	161	207	240	257	257	234	208	233	25
75～79	169	203	225	234	290	316	355	333	373	357	△ 16
80～84	130	157	203	262	255	354	436	486	448	483	35
85～89	72	92	146	218	283	286	403	417	415	521	106
90～94	30	42	67	114	163	239	299	302	272	348	76
95～99	4	3	21	23	40	88	109	138	149	158	9
100歳以上	1	-	1	4	7	24	25	30	32	35	3

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移 (男)

年齢階級	男										対前年増減 (23年-22年)
	昭和55年	60年	平成2年	7年	12年	17年	20年	21年	22年	23年	
	死 亡 数										
総 数	567	653	697	939	1 027	1 179	1 365	1 375	1 334	1 497	163
0～4歳	31	8	8	6	3	5	10	12	4	5	1
5～9	5		1	2	1	-	1	1	1	1	0
10～14	1	2	-	1	1	-	1	1	3	4	1
15～19	7	1	5	6	-	4	-	2	3	3	0
20～24	6	8	5	2	7	4	4	7	5	9	4
25～29	10	6	4	8	7	6	5	6	6	5	△
30～34	8	2	3	9	9	4	5	7	4	10	6
35～39	12	14	11	13	12	7	6	10	16	15	△
40～44	16	17	14	18	5	21	14	14	14	21	7
45～49	20	27	25	32	18	29	30	26	32	26	△
50～54	28	53	30	46	45	44	42	46	37	46	9
55～59	38	60	49	57	62	68	59	72	69	79	10
60～64	54	53	65	80	78	83	105	82	101	95	△
65～69	68	59	76	122	129	89	136	114	121	111	△
70～74	80	100	91	127	169	171	172	155	144	150	6
75～79	94	115	125	145	164	205	230	215	220	225	5
80～84	56	82	99	133	127	192	241	280	241	289	48
85～89	23	33	62	91	119	141	175	173	182	251	69
90～94	9	11	18	35	59	81	97	109	90	99	9
95～99	1	2	5	5	11	20	29	39	33	46	13
100歳以上	-	-	1	1	1	5	3	5	8	7	△

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移 (女)

年齢階級	女										対前年増減 (22年-21年)
	昭和55年	60年	平成2年	7年	12年	17年	20年	21年	22年	23年	
	死 亡 数										
総 数	513	521	596	751	816	949	1 136	1 149	1 192	1 272	80
0～4歳	18	5	6	6	2	4	3	6	4	7	3
5～9	4	1	1	1	-	-	-	1	2	1	△
10～14	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	△
15～19	1	3	2	1	5	1	-	1	-	1	1
20～24	2	3	3	4	2	2	3	2	5	-	△
25～29	7	4	1	4	1	1	5	1	-	1	1
30～34	9	5	3	5	3	5	3	1	3	5	2
35～39	7	8	8	6	9	5	7	10	8	7	△
40～44	10	12	9	14	7	12	5	9	10	7	△
45～49	13	18	13	14	19	19	14	21	9	16	7
50～54	17	22	21	24	27	23	25	17	27	13	△
55～59	37	31	27	23	27	33	48	28	29	27	△
60～64	39	25	29	53	30	34	34	37	49	52	3
65～69	50	52	50	71	56	61	52	51	66	67	1
70～74	74	78	70	80	71	86	85	79	64	83	19
75～79	75	88	100	89	126	111	125	118	153	132	△
80～84	74	75	104	129	128	162	195	206	207	194	△
85～89	49	59	84	127	164	145	228	244	233	270	37
90～94	21	31	49	79	104	158	202	193	182	249	67
95～99	3	1	16	18	29	68	80	99	116	112	△
100歳以上	1	-	-	3	6	19	22	25	24	28	4

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第3表-1 死亡の場所別にみた死亡数の年次推移

年次	総数	施設内					施設外	
		病院	診療所	介護老人 保健施設	助産所	老人 ホーム	自宅	その他
		死 亡 数						
昭和55年	1 080	684	69	・	-	・	327	・
60	1 174	884	55	・	-	・	197	38
平成元年	1 232	970	45	-	-	・	178	39
2	1 293	1 054	43	1	-	・	159	36
3	1 332	1 081	34	2	-	・	165	50
4	1 464	1 185	31	3	-	・	194	51
5	1 685	1 395	23	3	-	・	208	56
6	1 625	1 293	36	7	-	・	235	54
7	1 690	1 410	37	4	-	8	178	53
8	1 694	1 393	25	6	-	21	199	50
9	1 734	1 453	37	14	-	9	181	40
10	1 753	1 449	32	8	-	7	209	48
11	1 984	1 641	39	12	-	12	221	59
12	1 843	1 520	38	8	-	5	221	51
13	1 905	1 583	37	21	-	10	204	50
14	1 924	1 587	42	14	-	11	210	60
15	1 945	1 605	31	13	-	7	223	66
16	1 985	1 583	33	23	-	17	256	73
17	2 128	1 735	38	22	-	20	251	62
18	2 312	1 859	40	28	-	16	288	81
19	2 384	1 912	35	27	-	31	323	56
20	2 501	1 978	41	45	-	29	337	71
21	2 524	1 980	37	64	-	45	332	66
22	2 526	1 962	34	51	-	58	353	68
23	2 769	2 084	60	82	-	71	386	86

注：1) 平成6年以前は、老人ホームでの死亡が自宅又はその他に含まれている。

2) 昭和55年については、「施設外」の内訳を集計していないので、「自宅」に「施設外」の死亡数を計上した。

(死亡) 第3表-2 死亡の場所別にみた構成割合の年次推移

年次	総数	施設内					施設外	
		病院	診療所	介護老人 保健施設	助産所	老人 ホーム	自宅	その他
構成割合 (%)								
昭和55年	100.0	63.3	6.4	・	-	・	30.3	・
60	100.0	75.3	4.7	・	-	・	16.8	3.2
平成元年	100.0	78.7	3.7	-	-	・	14.4	3.2
2	100.0	81.5	3.3	0.1	-	・	12.3	2.8
3	100.0	81.2	2.6	0.2	-	・	12.4	3.8
4	100.0	80.9	2.1	0.2	-	・	13.3	3.5
5	100.0	82.8	1.4	0.2	-	・	12.3	3.3
6	100.0	79.6	2.2	0.4	-	・	14.5	3.3
7	100.0	83.4	2.2	0.2	-	0.5	10.5	3.1
8	100.0	82.2	1.5	0.4	-	1.2	11.7	3.0
9	100.0	83.8	2.1	0.8	-	0.5	10.4	2.3
10	100.0	82.7	1.8	0.5	-	0.4	11.9	2.7
11	100.0	82.7	2.0	0.6	-	0.6	11.1	3.0
12	100.0	82.5	2.1	0.4	-	0.3	12.0	2.8
13	100.0	83.1	1.9	1.1	-	0.5	10.7	2.6
14	100.0	82.5	2.2	0.7	-	0.6	10.9	3.1
15	100.0	82.5	1.6	0.7	-	0.4	11.5	3.4
16	100.0	79.7	1.7	1.2	-	0.9	12.9	3.7
17	100.0	81.5	1.8	1.0	-	0.9	11.8	2.9
18	100.0	80.4	1.7	1.2	-	0.7	12.5	3.5
19	100.0	80.2	1.5	1.1	-	1.3	13.5	2.3
20	100.0	79.1	1.6	1.8	-	1.2	13.5	2.8
21	100.0	78.4	1.5	2.5	-	1.8	13.2	2.6
22	100.0	77.7	1.3	2.0	-	2.3	14.0	2.7
23	100.0	75.3	2.2	3.0	-	2.6	13.9	3.1

注：1) 平成6年以前は、老人ホームでの死亡が自宅又はその他に含まれている。

2) 昭和55年については、「施設外」の内訳を集計していないので、「自宅」に「施設外」の死亡数を計上した。

(死亡) 第4表 死因順位(第5位まで)別にみた死亡数・死亡率(人口10万対)の年次推移

年次	第1位			第2位			第3位		
	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率
昭和55年	悪性新生物	258	112.6	脳血管疾患	237	103.4	心疾患	178	77.7
60	悪性新生物	300	127.4	心疾患	229	97.3	脳血管疾患	209	88.8
平成元年	悪性新生物	345	149.4	心疾患	244	105.6	脳血管疾患	189	81.8
2	悪性新生物	383	162.7	心疾患	255	108.3	脳血管疾患	158	67.1
3	悪性新生物	392	166.2	心疾患	253	107.3	脳血管疾患	202	85.6
4	悪性新生物	392	139.1	心疾患	280	99.3	脳血管疾患	253	89.8
5	悪性新生物	438	154.6	心疾患	327	115.4	脳血管疾患	259	91.4
6	悪性新生物	434	152.3	心疾患	295	103.5	脳血管疾患	236	82.8
7	悪性新生物	547	190.9	脳血管疾患	271	94.6	心疾患	240	83.8
8	悪性新生物	532	185.2	脳血管疾患	267	92.9	心疾患	254	88.4
9	悪性新生物	530	184.4	脳血管疾患	310	107.9	心疾患	232	80.7
10	悪性新生物	535	185.9	脳血管疾患	295	102.5	心疾患	265	92.1
11	悪性新生物	614	213.5	脳血管疾患	325	113.0	心疾患	293	101.9
12	悪性新生物	588	203.6	脳血管疾患	289	100.1	心疾患	246	85.2
13	悪性新生物	605	209.6	脳血管疾患	327	113.3	心疾患	273	94.6
14	悪性新生物	653	226.3	脳血管疾患	305	105.7	心疾患	267	92.5
15	悪性新生物	633	219.7	脳血管疾患	323	112.1	心疾患	257	89.2
16	悪性新生物	616	213.9	心疾患	322	111.8	脳血管疾患	285	99.0
17	悪性新生物	671	233.6	脳血管疾患	310	107.9	心疾患	294	102.4
18	悪性新生物	709	236.2	脳血管疾患	406	135.3	心疾患	329	109.6
19	悪性新生物	721	240.6	心疾患	370	123.4	脳血管疾患	358	119.4
20	悪性新生物	779	260.8	脳血管疾患	384	128.6	心疾患	366	122.5
21	悪性新生物	773	259.1	心疾患	363	121.7	脳血管疾患	353	118.3
22	悪性新生物	806	270.2	心疾患	399	133.7	脳血管疾患	284	95.2
23	悪性新生物	833	278.1	心疾患	427	142.5	脳血管疾患	359	119.8

注：脳血管疾患の平成6年から平成7年にかけての増加は、平成7年1月からのICD-10の適用による死因選択ルールのものであると考えられる。

1) 昭和55年については「肺炎」だけの集計がないので、第4位は「肺炎及び気管支炎」としている。

年次	第 4 位			第 5 位		
	死 因	死亡数	死亡率	死 因	死亡数	死亡率
昭和55年	肺炎及び気管支炎	80	34.9	不慮の事故	43	18.8
60	肺 炎	86	36.5	自 殺	49	20.8
平成元年	肺 炎	104	45.0	不慮の事故	46	19.9
2	肺 炎	137	58.2	不慮の事故	60	25.5
3	肺 炎	127	53.8	不慮の事故	53	22.5
4	肺 炎	137	48.6	不慮の事故	62	22.0
5	肺 炎	199	70.2	不慮の事故	77	27.2
6	肺 炎	190	66.7	不慮の事故	72	25.3
7	肺 炎	154	53.8	不慮の事故	73	25.5
8	肺 炎	144	50.1	不慮の事故	67	23.3
9	肺 炎	148	51.5	不慮の事故	82	28.5
10	肺 炎	132	45.9	自 殺	74	25.7
11	肺 炎	173	60.2	不慮の事故	66	22.9
12	肺 炎	172	59.5	不慮の事故	73	25.3
13	肺 炎	160	55.4	自 殺	71	24.6
14	肺 炎	152	52.7	不慮の事故	73	25.3
15	肺 炎	172	59.7	自 殺	71	24.6
16	肺 炎	169	58.7	不慮の事故	78	27.1
17	肺 炎	218	75.9	不慮の事故	67	23.3
18	肺 炎	225	75.0	自 殺	89	29.7
19	肺 炎	250	83.4	自 殺	76	25.4
20	肺 炎	258	86.4	自 殺	88	29.5
21	肺 炎	260	87.2	不慮の事故	90	30.2
22	肺 炎	231	77.4	不慮の事故	73	24.5
23	肺 炎	271	90.5	不慮の事故	104	34.7

第5表-1 選択死因分類別にみた性別死亡数の年次推移

選択死因分類コード・性		平成8年	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
全死因	男女	1 694 947 747	1 734 924 810	1 753 970 783	1 984 1 095 889	1 843 1 027 816	1 905 1 036 869	1 924 1 045 879	1 945 1 089 856	1 985 1 089 896	2 128 1 179 949	2 312 1 230 1 082	2 384 1 312 1 072	2 501 1 365 1 136	2524 1375 1149	2526 1334 1192	2769 1497 1272	
	Se 01 結核	男女	5 3 2	3 3 -	4 3 1	2 1 1	6 4 2	2 1 1	2 1 2	3 4 3	7 8 3	9 2 1	3 1 1	2 2 -	4 3 1	3 3 -	1 1 3	
Se 02 悪性新生物	男女	532 321 211	530 318 212	535 325 210	614 381 233	588 359 229	605 370 235	653 389 264	633 365 268	616 359 257	671 400 271	709 409 300	721 443 278	779 469 310	773 442 331	806 469 337	833 479 354	
	(再掲) Se 03 食道	男女	17 15 2	21 18 3	20 18 2	16 14 2	24 20 4	21 19 2	32 25 7	20 17 3	23 19 4	30 27 3	22 17 5	26 24 2	31 29 2	20 18 4	21 17 4	37 31 6
Se 04 胃	男女	74 52 22	72 47 25	84 58 26	103 78 25	90 59 31	81 55 26	97 55 42	97 68 29	80 48 32	75 53 22	101 62 39	93 57 36	81 53 28	102 71 31	109 76 33	90 57 33	
	Se 05 結腸	男女	70 35 35	52 23 29	62 38 24	70 36 34	76 39 37	66 34 32	74 37 37	77 41 36	70 33 37	78 35 41	73 34 38	65 34 31	78 39 39	73 35 38	85 45 40	86 46 40
Se 06 直腸S状結腸移行部 及び直腸	男女	29 19 10	36 25 11	33 22 11	23 16 7	26 19 7	39 28 11	25 19 6	26 15 11	37 21 16	38 25 13	29 17 12	37 24 13	45 28 17	33 14 19	29 15 14	37 18 19	
	Se 07 肝及び肝内胆管	男女	39 27 12	38 28 10	41 31 10	50 26 24	50 35 15	48 33 18	70 52 16	45 29 16	42 26 16	49 32 17	49 30 19	44 27 17	68 49 19	58 29 29	72 44 28	53 31 22
Se 08 胆のう及びその他の胆道	男女	28 13 15	27 9 18	33 15 18	22 13 9	27 12 15	19 9 10	29 15 14	29 13 16	37 23 14	26 18 8	26 20 26	46 24 11	35 19 26	45 13 27	40 21 21	53 25 28	
	Se 09 膵	男女	37 24 13	43 21 22	31 12 19	44 26 18	43 23 20	48 20 28	42 28 14	53 31 22	44 21 23	49 31 27	51 37 20	53 37 16	67 36 31	69 36 28	58 32 26	72 42 30
Se 10 気管、気管支及び肺	男女	78 55 23	95 69 26	90 70 20	100 77 23	92 76 16	99 72 27	103 69 27	106 69 37	104 70 34	112 80 32	130 93 37	131 105 26	128 98 30	145 99 46	135 100 35	127 93 34	
	Se 11 乳房	男女	20 -	13 -	22 -	18 -	24 -	23 1	28 -	27 -	28 -	28 -	23 -	28 -	23 -	38 -	38 -	34 1
Se 12 子宮	男女	11 11	11 11	11 11	14 14	7 7	11 11	13 13	14 14	7 7	18 18	13 13	22 22	14 14	11 11	19 19	13 13	
	Se 13 白血病	男女	16 8 8	14 9 5	12 4 8	16 7 9	12 6 6	17 10 7	13 7 6	10 3 7	7 4 3	14 7 3	11 8 7	14 8 6	18 12 6	17 12 5	14 9 5	18 11 7
Se 14 糖尿病	男女	27 13 14	25 13 12	18 7 11	37 17 20	28 15 13	17 11 6	21 11 10	15 7 8	32 16 16	31 22 9	24 12 12	30 16 14	37 23 14	31 18 13	58 28 30	47 34 13	
	Se 15 高血圧性疾患	男女	16 8 8	13 3 10	12 5 7	20 14 6	14 5 9	16 4 12	10 5 5	10 4 6	9 5 4	7 5 2	15 5 10	22 9 13	20 9 11	8 4 4	14 8 6	17 6 11
Se 16 心疾患(高血圧性を除く)	男女	254 132 122	232 119 113	265 144 121	293 138 155	246 125 121	273 140 133	267 155 112	257 134 123	322 174 148	294 167 127	329 169 160	370 189 181	366 186 180	363 178 185	399 195 204	427 227 200	
	(再掲) Se 17 急性心筋梗塞	男女	98 58 40	88 49 39	77 40 37	97 40 57	63 33 30	77 46 31	80 44 36	60 32 28	91 55 36	79 46 39	77 46 31	63 32 31	68 35 33	63 33 30	63 40 23	68 40 28
Se 18 その他の虚血性心疾患	男女	34 19 15	34 16 18	27 14 13	36 21 15	28 12 16	25 18 7	26 11 15	23 14 9	33 17 16	30 17 13	32 11 21	32 22 10	37 25 12	36 18 18	48 29 19	42 25 17	
	Se 19 不整脈及び伝導障害	男女	35 20 15	38 24 14	70 44 26	62 35 27	65 36 29	64 32 32	75 50 25	72 46 26	93 54 39	96 68 28	100 61 39	109 67 42	107 64 43	114 61 53	122 64 58	133 85 48
Se 20 心不全	男女	56 20 36	41 16 25	60 25 35	55 19 36	53 27 26	68 27 40	53 28 28	53 25 43	74 31 40	62 22 40	63 29 34	88 47 50	123 43 76	114 47 64	111 47 84	123 39 84	132 56 76

選択死因分類コード・性	平成8年	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Se 21 脳血管疾患	267	310	295	325	289	327	305	323	285	310	406	358	384	353	284	359
男女	140 127	139 171	137 158	153 172	147 142	145 182	155 150	168 155	148 137	148 162	192 214	171 187	193 191	184 169	148 136	165 194
(再掲) Se 22 くも膜下出血	34	29	41	27	25	30	28	33	35	38	45	30	33	33	29	34
男女	15 19	12 17	16 25	7 20	9 16	6 24	8 20	9 24	13 22	13 25	19 26	9 21	11 22	11 22	12 17	12 22
Se 23 脳内出血	60	91	85	87	97	103	88	86	103	99	131	137	142	133	100	113
男女	37 23	46 45	45 40	51 36	54 43	46 57	44 44	54 32	64 39	53 46	67 64	69 68	82 60	85 48	57 43	60 53
Se 24 脳梗塞	168	187	166	205	164	192	184	199	144	170	225	189	204	179	148	210
男女	85 83	81 106	76 90	92 113	84 80	92 100	102 82	102 97	69 75	81 89	104 121	93 96	97 107	84 95	73 75	91 119
Se 25 大動脈瘤及び解離	13	23	20	24	29	26	25	22	28	21	24	29	29	40	35	30
男女	8 5	13 10	14 6	15 9	16 13	18 8	11 14	17 5	13 15	12 9	11 13	20 9	9 20	20 13	24 11	20 10
Se 26 肺炎	144	148	132	173	172	160	152	172	169	218	225	250	258	260	231	271
男女	79 65	65 83	75 57	87 86	90 82	81 79	74 78	91 81	84 85	114 104	112 113	120 130	134 124	136 124	124 107	140 131
Se 27 慢性閉塞性肺疾患	9	20	14	21	14	18	22	19	13	26	18	28	32	21	30	34
男女	7 2	14 6	10 4	16 5	13 1	15 3	14 8	14 5	11 2	20 6	15 3	22 6	29 3	20 1	25 5	30 4
Se 28 喘息	6	4	5	9	9	6	2	3	3	5	-	-	4	5	2	3
男女	4 2	2 2	2 3	5 4	2 7	5 1	1 1	3 -	1 2	3 2	3 -	- -	1 3	3 2	- 2	1 2
Se 29 肝疾患	21	28	28	26	22	38	18	28	20	23	35	23	27	45	27	39
男女	14 7	22 6	21 7	17 9	17 5	23 15	9 9	21 7	16 4	16 7	24 11	15 8	12 15	28 17	20 7	21 18
Se 30 腎不全	39	28	38	34	43	37	33	32	45	44	36	43	51	53	55	56
男女	23 16	15 13	18 20	19 15	27 16	15 22	19 14	12 20	18 27	26 18	20 16	22 21	30 21	28 25	26 29	33 23
Se 31 老衰	18	20	13	22	17	22	31	28	24	38	21	25	35	47	62	86
男女	5 13	2 18	4 9	4 18	5 12	4 18	4 27	3 25	6 18	7 31	4 17	9 16	8 27	11 36	17 45	25 61
Se 32 不慮の事故	67	82	65	66	73	65	73	70	78	67	75	71	56	90	73	104
男女	41 26	51 31	34 31	42 24	45 28	48 17	45 28	50 20	51 27	43 24	41 34	50 21	38 18	57 33	32 41	56 48
(再掲) Se 33 交通事故	25	27	19	26	23	22	22	20	25	15	15	15	8	12	9	12
男女	15 10	23 4	11 8	20 6	19 4	17 5	16 6	16 4	14 11	7 8	8 7	10 5	3 5	7 5	4 5	6 6
Se 34 自殺	48	49	74	61	68	71	69	71	76	59	89	76	88	69	68	59
男女	34 14	33 16	57 17	49 12	44 24	47 24	50 19	57 14	52 24	46 13	59 30	61 15	57 31	49 20	43 25	44 15

注：1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 平成7年以降は、死因について「選択死因分類」を使用している。

(死亡) 第5表-2 主な死因簡単分類別にみた性別死亡数の年次推移

簡単分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
全 死 因	1 080	1 174	1 232	1 293	1 332	1 464	1 685	1 625
男	653	666	697	742	806	947	885	
女	427	508	535	551	628	738	740	
4,72 胃 腸 炎	...	1	1	-	3	2	2	2
男	...	-	-	-	2	2	1	-
女	...	1	1	-	1	-	1	2
5,6 全 結 核	9	6	1	1	2	2	2	6
男	...	5	1	-	1	1	2	5
女	...	1	-	1	1	1	-	1
28-37 悪 性 新 生 物	258	300	345	383	392	392	438	434
男	...	184	192	211	229	216	273	267
女	...	116	153	172	163	176	165	167
28 食 道	...	10	15	12	20	22	11	12
男	...	9	10	11	16	17	9	10
女	...	1	5	1	4	5	2	2
29 胃	...	66	69	76	62	65	86	85
男	...	44	41	46	42	42	56	52
女	...	22	28	30	20	23	30	33
30 大 腸	48	63	53	72	52
男	21	32	24	43	35
女	27	31	29	29	17
直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	...	19	19	17	15	23	23	16
男	...	10	13	8	11	9	16	11
女	...	9	6	9	4	14	7	5
31 結 腸	31	48	30	49	36
男	13	21	15	27	24
女	18	27	15	22	12
32 肝	...	24	29	35	42	27	35	38
男	...	17	20	23	28	23	26	25
女	...	7	9	12	14	4	9	13
33 脾	...	17	21	23	25	35	22	23
男	...	9	13	11	10	20	14	12
女	...	8	8	12	15	15	8	11
34 気管, 気管支及び肺	...	46	53	57	65	66	78	79
男	...	38	40	39	46	47	57	58
女	...	8	13	18	19	19	21	21
35 乳 房	...	10	21	19	12	18	15	16
男	...	-	1	-	-	-	-	-
女	...	10	20	19	12	18	15	16
36 子 宮	...	12	10	5	11	9	10	10
女	...	12	10	5	11	9	10	10
37 白 血 病	...	8	8	6	10	7	10	8
男	...	4	5	4	5	2	5	3
女	...	4	3	2	5	5	5	5
39 そ の 他	...	88	100	133	130	120	148	147
男	...	53	49	69	71	56	90	96
女	...	35	51	64	59	64	58	51
46, 51-52, 54-56 糖 尿 病	17	16	20	12	19	16	22	23
男	...	10	12	4	7	9	11	9
女	...	6	8	8	12	7	11	14
46, 51-52, 54-56 心 疾 患	178	229	244	255	253	280	327	295
男	...	124	125	135	132	157	171	156
女	...	105	119	120	121	123	156	139
51, 52 虚 血 性 心 疾 患	...	81	77	68	81	77	99	87
男	...	54	43	44	46	47	48	48
女	...	27	34	24	35	30	51	39
46, 54 慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	...	8	16	8	8	12	14	19
男	...	1	5	3	3	5	6	12
女	...	7	11	5	5	7	8	7

注：1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 昭和55年については、市町村別集計において男女別の集計をしていないので不明とした。

3) 平成6年以前は、死因について「簡単分類番号」を使用している。

简单分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
48, 49 高血圧性疾患	17	13	15	9	7	14	7	11
男女	...	2	8	4	2	5	3	6
48	...	11	7	5	5	9	4	5
高血圧性心疾患	...	7	11	7	4	11	5	8
男女	...	2	6	4	2	5	2	5
男女	...	5	5	3	2	6	3	3
58-60 脳血管疾患	237	209	189	158	202	253	259	236
男女	...	103	85	73	98	111	133	96
男女	...	106	104	85	104	142	126	140
62, 63, 66 肺炎及び気管支炎	80	91	107	142	135	143	211	196
男女	...	55	61	82	75	87	117	102
男女	...	36	46	60	60	56	94	94
63 肺炎	...	86	104	137	127	137	199	190
男女	...	52	60	80	71	81	112	97
男女	...	34	44	57	56	56	87	93
69 胃及び十二指腸潰瘍	...	10	7	7	2	6	12	8
男女	...	6	4	2	1	4	5	4
男女	...	4	3	5	1	2	7	4
73 慢性肝疾患及び肝硬変	19	16	24	18	19	19	20	23
男女	...	14	18	13	10	15	14	18
男女	...	2	6	5	9	4	6	5
76, 77 腎炎ネフローゼ症候群及びネフローゼ	12	14	34	29	33	46	48	40
男女	...	3	20	11	19	24	26	20
男女	...	11	14	18	14	22	22	20
88 精神病の記載のない老衰	18	16	15	17	12	13	22	16
男女	...	4	2	5	5	3	7	7
男女	...	12	13	12	7	10	15	9
E104-E114 不慮の事故及び有害作用	43	37	46	60	53	62	77	72
男女	...	28	33	40	41	44	56	49
男女	...	9	13	20	12	18	21	23
E104 自動車事故	...	12	17	28	28	29	44	27
男女	...	9	13	18	22	19	35	19
男女	...	3	4	10	6	10	9	8
E105 自動車事故以外の交通事故	...	2	2	4	-	5	-	-
男女	...	2	2	4	-	3	-	-
男女	...	-	-	-	-	2	-	-
E108 火災及び火焰による不慮の事故	...	2	-	1	3	2	3	5
男女	...	1	-	1	2	1	1	2
男女	...	1	-	-	1	1	2	3
E110 不慮の溺死	...	7	2	3	7	6	6	3
男女	...	6	2	1	5	5	5	3
男女	...	1	-	2	2	1	1	-
E115 自殺	38	49	36	36	41	42	36	41
男女	...	28	26	21	25	29	23	26
男女	...	21	10	15	16	13	13	15

選択死因分類コード・性	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Se 21 脳血管疾患	92.9	107.9	102.5	113.0	100.1	113.3	105.7	112.1	99.0	107.9	135.3	119.4	128.6	118.3	95.2	119.8
男女	101.7 84.8	100.9 114.4	99.2 105.5	111.0 114.9	106.1 94.5	104.8 121.1	112.2 99.8	121.9 103.1	107.5 91.1	107.8 108.1	134.0 136.4	119.8 119.1	135.9 121.9	129.9 107.9	104.5 86.7	116.2 123.1
(再掲) Se 22 くも膜下出血	11.8	10.1	14.2	9.4	8.7	10.4	9.7	11.5	12.2	13.2	15.0	10.0	11.0	11.1	9.7	11.3
男女	10.9 12.7	8.7 11.4	11.6 16.7	5.1 13.4	6.5 10.6	4.3 16.0	5.8 13.3	6.5 16.0	9.4 14.6	9.5 16.7	13.3 16.6	6.3 13.4	7.7 14.0	7.8 14.0	8.5 10.8	8.5 14.0
Se 23 脳内出血	20.9	31.7	29.5	30.2	33.6	35.7	30.5	29.8	35.8	34.5	43.6	45.7	47.5	44.6	33.5	37.7
男女	26.9 15.4	33.4 30.1	32.6 26.7	37.0 24.0	39.0 28.6	33.2 37.9	31.8 29.3	39.2 21.3	46.5 25.9	38.6 30.7	46.8 40.8	48.3 43.3	57.7 38.3	60.0 30.6	40.3 27.4	42.3 33.6
Se 24 脳梗塞	58.5	65.1	57.7	71.3	56.8	66.5	63.8	69.1	50.0	59.2	75.0	63.1	68.3	60.0	49.6	70.1
男女	61.8 55.5	58.8 70.9	55.0 60.1	66.7 75.5	60.6 53.2	66.5 54.6	73.8 64.5	74.0 64.5	50.1 49.9	59.0 59.4	72.6 77.1	65.1 61.2	68.3 68.3	59.3 60.6	51.6 47.8	64.1 75.5
Se 25 大動脈瘤及び解離	4.5	8.0	6.9	8.3	10.0	9.0	8.7	7.6	9.7	7.3	8.0	9.7	9.7	13.4	11.7	10.0
男女	5.8 3.3	9.4 6.7	10.1 4.0	10.9 6.0	11.5 8.6	13.0 5.3	12.3 9.3	8.0 3.3	9.4 10.0	8.7 6.0	14.0 8.3	14.0 5.7	6.3 12.8	19.1 8.3	17.0 7.0	14.1 6.3
Se 26 肺炎	50.1	51.5	45.9	60.2	59.5	55.4	52.7	59.7	58.7	75.9	75.0	83.4	86.4	87.2	77.4	90.5
男女	57.4 43.4	47.2 55.5	54.3 38.1	63.1 57.4	65.0 54.6	58.5 52.6	53.5 51.9	66.0 53.9	61.0 56.5	83.1 69.4	78.2 72.0	84.1 82.8	94.3 79.2	96.0 79.2	87.6 68.2	98.6 83.1
Se 27 慢性閉塞性肺疾患	3.1	7.0	4.9	7.3	4.8	6.2	7.6	6.6	4.5	9.1	6.0	9.3	10.7	7.0	10.1	11.3
男女	5.1 1.3	10.2 4.0	7.2 2.7	11.6 3.3	9.4 0.7	10.8 2.0	10.1 5.3	10.2 3.3	8.0 1.3	14.6 4.0	15.4 1.9	15.4 3.8	20.4 1.9	14.1 0.6	17.7 3.2	21.1 2.5
Se 28 喘息	2.1	1.4	1.7	3.1	3.1	2.1	0.7	1.0	1.0	1.7	-	-	1.3	1.7	0.7	1.0
男女	2.9 1.3	1.5 1.3	1.4 2.0	3.6 2.7	1.4 4.7	3.6 0.7	0.7 0.7	2.2 -	0.7 1.3	2.2 1.3	-	-	0.7 1.9	2.1 1.3	-	0.7 1.3
Se 29 肝疾患	7.3	9.7	9.7	9.0	7.6	13.2	6.2	9.7	6.9	8.0	11.7	7.7	9.0	15.1	9.0	13.0
男女	10.2 4.7	16.0 4.0	15.2 4.7	12.3 6.0	12.3 3.3	16.6 10.0	6.5 6.0	15.2 4.7	11.6 2.7	11.7 4.7	16.8 7.0	10.5 5.1	8.4 9.6	19.8 10.9	14.1 4.5	14.8 11.4
Se 30 腎不全	13.6	9.7	13.2	11.8	14.9	12.8	11.4	11.1	15.6	15.3	12.0	14.3	17.1	17.8	18.4	18.7
男女	16.7 10.7	10.9 8.7	13.0 13.4	13.8 10.0	19.5 10.6	10.8 14.6	13.7 9.3	8.7 13.3	13.1 18.0	18.9 12.0	14.0 10.2	15.4 13.4	21.1 13.4	19.8 16.0	18.4 18.5	23.2 14.6
Se 31 老衰	6.3	7.0	4.5	7.6	5.9	7.6	10.7	9.7	8.3	13.2	7.0	8.3	11.7	15.8	20.8	28.7
男女	3.6 8.7	1.5 12.0	2.9 6.0	2.9 12.0	3.6 8.0	2.9 12.0	2.2 18.0	2.2 16.6	4.4 12.0	5.1 20.7	2.8 10.8	6.3 10.2	5.6 17.2	7.8 23.0	12.0 28.7	17.6 38.7
Se 32 不慮の事故	23.3	28.5	22.6	22.9	25.3	22.5	25.3	24.3	27.1	23.3	25.0	23.7	18.7	30.2	24.5	34.7
男女	29.8 17.4	37.0 20.7	24.6 20.7	30.5 16.0	32.5 18.6	34.7 11.3	32.6 18.6	36.3 13.3	37.1 18.0	31.3 16.0	28.6 21.7	35.0 13.4	26.8 11.5	40.2 21.1	22.6 26.2	39.4 30.5
(再掲) Se 33 交通事故	8.7	9.4	6.6	9.0	8.0	7.6	7.6	6.9	8.7	5.2	5.0	5.0	2.7	4.0	3.0	4.0
男女	10.9 6.7	16.7 2.7	8.0 5.3	14.5 4.0	13.7 2.7	12.3 3.3	11.6 4.0	11.6 2.7	10.2 7.3	5.1 5.3	5.6 4.5	7.0 3.2	2.1 3.2	4.9 3.2	2.8 3.2	4.2 3.8
Se 34 自殺	16.7	17.1	25.7	21.2	23.5	24.6	23.9	24.6	26.4	20.5	29.7	25.4	29.5	23.1	22.8	19.7
男女	24.7 9.4	23.9 10.7	41.3 11.4	35.5 8.0	31.8 16.0	34.0 16.0	36.2 12.6	41.4 9.3	37.8 16.0	33.5 8.7	41.2 19.1	42.7 9.6	40.1 12.8	34.6 12.8	30.4 15.9	31.0 9.5

(死亡) 第6表-2 主な死因簡単分類別にみた性別死亡率(人口10万対)の年次推移

簡単分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
全 死 因	471.4	498.6	533.4	549.2	564.7	519.4	594.6	570.4
男女	...	577.7	609.0	620.4	659.1	597.3	698.7	649.3
4,72	...	425.5	465.4	484.2	478.4	447.8	499.1	497.9
胃 腸 炎	...	0.4	0.4	...	1.3	0.7	0.7	0.7
男女	1.8	1.5	0.7	...
5,6	...	0.8	0.8	...	0.8	...	0.7	1.3
全 結 核	3.9	2.5	0.4	0.4	0.8	0.7	0.7	2.1
男女	...	4.4	0.9	...	0.9	0.7	1.5	3.7
28-37	...	0.8	...	0.8	0.8	0.7	...	0.7
悪 性 新 生 物	112.6	127.4	149.4	162.7	166.2	139.1	154.6	152.3
男女	...	162.8	175.6	187.8	203.4	160.1	201.4	195.9
28	...	94.7	125.8	139.7	132.2	119.8	111.6	112.4
食 道	...	4.2	6.5	5.1	8.5	7.8	3.9	4.2
男女	...	8.0	9.1	9.8	14.2	12.6	6.6	7.3
29	...	0.8	4.1	0.8	3.2	3.4	1.4	1.3
胃	...	28.0	29.9	32.3	26.3	23.1	30.3	29.8
男女	...	38.9	37.5	40.9	37.3	31.1	41.3	38.2
...	...	18.0	23.0	24.4	16.2	15.7	20.3	22.2
大 腸	20.4	26.7	18.8	25.4	18.3
男女	18.7	28.4	17.8	31.7	25.7
30	21.9	25.1	19.7	19.6	11.4
直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	...	8.1	8.2	7.2	6.4	8.2	8.1	5.6
男女	...	8.8	11.9	7.1	9.8	6.7	11.8	8.1
...	...	7.4	4.9	7.3	3.2	9.5	4.7	3.4
結 腸	13.2	20.3	10.6	17.3	12.6
男女	11.6	18.7	11.1	19.9	17.6
31	14.6	21.9	10.2	14.9	8.1
肝	...	10.2	12.6	14.9	17.8	9.6	12.4	13.3
男女	...	15.0	18.3	20.5	24.9	17.0	19.2	18.3
32	...	5.7	7.4	9.7	11.4	2.7	6.1	8.7
膵	...	7.2	9.1	9.8	10.6	12.4	7.8	8.1
男女	...	8.0	11.9	9.8	8.9	14.8	10.3	8.8
33	...	6.5	6.6	9.7	12.2	10.2	5.4	7.4
気管, 気管支及び肺	...	19.5	22.9	24.2	27.6	23.4	27.5	27.7
男女	...	33.6	36.6	34.7	40.9	34.8	42.1	42.6
34	...	6.5	10.7	14.6	15.4	12.9	14.2	14.1
乳 房	...	4.2	9.1	8.1	5.1	6.4	5.3	5.6
男女	0.9
35	...	8.2	16.4	15.4	9.7	12.3	10.1	10.8
子 宮	...	5.1	8.2	4.1	8.9	6.1	6.8	6.7
36	...	9.8	8.2	4.1	8.9	6.1	6.8	6.7
白 血 病	...	3.4	3.5	2.5	4.2	2.5	3.5	2.8
男女	...	3.5	4.6	3.6	4.4	1.5	3.7	2.2
37	...	3.3	2.5	1.6	4.1	3.4	3.4	3.4
そ の 他	...	37.4	43.3	56.5	55.1	42.6	52.2	51.6
男女	...	46.9	44.8	61.4	63.1	41.5	66.4	70.4
39	...	28.6	41.9	52.0	47.8	43.6	39.2	34.3
糖 尿 病	7.4	6.8	8.7	5.1	8.1	5.7	7.8	8.1
男女	...	8.8	11.0	3.6	6.2	6.7	8.1	6.6
46, 51-52, 54-56	...	4.9	6.6	6.5	9.7	4.8	7.4	9.4
心 疾 患	77.7	97.3	105.6	108.3	107.3	99.3	115.4	103.5
男女	...	109.7	114.3	120.2	117.3	116.4	126.2	114.5
51, 52	...	85.8	97.9	97.5	98.1	83.7	105.5	93.5
虚 血 性 心 疾 患	...	34.4	33.3	28.9	34.3	27.3	34.9	30.5
男女	...	47.8	39.3	39.2	40.9	34.8	35.4	35.2
46, 54	...	22.1	28.0	19.5	28.4	20.4	34.5	26.2
慢性リウマチ性心疾患及び心内臓の慢性疾患	...	3.4	6.9	3.4	3.4	4.3	4.9	6.7
男女	...	0.9	4.6	2.7	2.7	3.7	4.4	8.8
...	...	5.7	9.0	4.1	4.1	4.8	5.4	4.7

注: 1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 昭和55年については、市町村別集計において男女別の集計をしていないので不明とした。

3) 平成6年以前は、死因について「簡単分類番号」を使用している。

简单分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
48, 49 高血圧性疾患	7.4	5.5	6.5	3.8	3.0	5.0	2.5	3.9
男	...	1.8	7.3	3.6	1.8	3.7	2.2	4.4
女	...	9.0	5.8	4.1	4.1	6.1	2.7	3.4
48 高血圧性心疾患	...	3.0	4.8	3.0	1.7	3.9	1.8	2.8
男	...	1.8	5.5	3.6	1.8	3.7	1.5	3.7
女	...	4.1	4.1	2.4	1.6	4.1	2.0	2.0
58-60 脳血管疾患	103.4	88.8	81.8	67.1	85.6	89.8	91.4	82.8
男	...	91.1	77.7	65.0	87.1	82.3	98.1	70.4
女	...	86.6	85.5	69.1	84.3	96.6	85.2	94.2
62, 63, 66 肺炎及び気管支炎	34.9	38.6	46.3	60.3	57.2	50.7	74.5	68.8
男	...	48.7	55.8	73.0	66.6	64.5	86.3	74.8
女	...	29.4	37.8	48.7	48.7	38.1	63.6	63.3
63 肺炎	...	36.5	45.0	58.2	53.8	48.6	70.2	66.7
男	...	46.0	54.9	71.2	63.1	60.0	82.6	71.2
女	...	27.8	36.2	46.3	45.4	38.1	58.8	62.6
69 胃及び十二指腸潰瘍	...	4.2	3.0	3.0	0.8	2.1	4.2	2.8
男	...	5.3	3.7	1.8	0.9	3.0	3.7	2.9
女	...	3.3	2.5	4.1	0.8	1.4	4.7	2.7
73 慢性肝疾患及び肝硬変	8.3	6.8	10.4	7.6	8.1	6.7	7.1	8.1
男	...	12.4	16.5	11.6	8.9	11.1	10.3	13.2
女	...	1.6	4.9	4.1	7.3	2.7	4.1	3.4
76, 77 腎炎ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5.2	5.9	14.7	12.3	14.0	16.3	16.9	14.0
男	...	2.7	18.3	9.8	16.9	17.8	19.2	14.7
女	...	9.0	11.5	14.6	11.4	15.0	14.9	13.5
88 精神病の記載のない老衰	7.9	6.8	6.5	7.2	5.1	4.6	7.8	5.6
男	...	3.5	1.8	4.5	4.4	2.2	5.2	5.1
女	...	9.8	10.7	9.7	5.7	6.8	10.1	6.1
E104-E114 不慮の事故及び有害作用	18.8	15.7	19.9	25.5	22.5	22.0	27.2	25.3
男	...	24.8	30.2	35.6	36.4	32.6	41.3	36.0
女	...	7.4	10.7	16.2	9.7	12.3	14.2	15.5
E104 自動車事故	...	5.1	7.4	11.9	11.9	10.3	15.5	9.5
男	...	8.0	11.9	16.0	19.5	14.1	25.8	13.9
女	...	2.5	3.3	8.1	4.9	6.8	6.1	5.4
E105 自動車事故以外の交通事故	...	0.8	0.9	1.7	...	1.8
男	...	1.8	1.8	3.6	...	2.2
女	1.4
E108 火災及び火焰による不慮の事故	...	0.8	...	0.4	1.3	0.7	1.1	1.8
男	...	0.9	...	0.9	1.8	0.7	0.7	1.5
女	...	0.8	...	-	0.8	0.7	1.4	2.0
E110 不慮の溺死	...	3.0	0.9	1.3	3.0	2.1	2.1	1.1
男	...	5.3	1.8	0.9	4.4	3.7	3.7	2.2
女	...	0.8	...	1.6	1.6	0.7	0.7	...
E115 自殺	16.6	20.8	15.6	15.3	17.4	14.9	12.7	14.4
男	...	24.8	23.8	18.7	22.2	21.5	17.0	19.1
女	...	17.2	8.2	12.2	13.0	8.8	8.8	10.1