

(死亡) 第1表 性別にみた死因順位(第10位まで)別 死亡数・死亡率(人口10万対)・構成割合

死 因	平成 27 年			平成 26 年			対前年増減	
	死亡数	死亡率	死亡総数に占める割合 (%)	死亡数	死亡率	死亡総数に占める割合 (%)	死亡数	死亡率
	総 数							
全 死 因	2,945	989.5	100.0	2,887	962.0	100.0	58	27.5
悪 性 新 生 物 (1)	810	272.1	27.5	830	276.6	28.7	△ 20	△ 4.5
心 疾 患 (2)	456	153.2	15.5	443	147.6	15.3	13	5.6
脳 血 管 疾 患 (3)	351	117.9	11.9	356	118.6	12.3	△ 5	△ 0.7
肺 炎 (4)	245	82.3	8.3	285	95.0	9.9	△ 40	△ 12.7
老 衰 (5)	184	61.8	6.2	143	47.6	5.0	41	14.2
不 慮 の 事 故 (6)	79	26.5	2.7	92	30.7	3.2	△ 13	△ 4.2
自 殺 (7)	49	16.5	1.7	74	24.7	2.6	△ 25	△ 8.2
大動脈瘤および解離 (8)	46	15.5	1.6	42	14.0	1.5	4	1.5
腎 不 全 (9)	43	14.4	1.5	55	18.3	1.9	△ 12	△ 3.9
糖 尿 病 (10)	38	12.8	1.3	37	12.3	1.3	1	0.5
	男							
全 死 因	1,475	1045.4	100.0	1,522	1070.5	100.0	△ 47	△ 25.1
悪 性 新 生 物 (1)	446	316.1	30.2	479	336.9	31.5	△ 33	△ 20.8
心 疾 患 (2)	221	156.6	15.0	221	155.4	14.5	0	1.2
脳 血 管 疾 患 (3)	169	119.8	11.5	185	130.1	12.2	△ 16	△ 10.3
肺 炎 (4)	131	92.8	8.9	161	113.2	10.6	△ 30	△ 20.4
老 衰 (5)	48	34.0	3.3	27	19.0	1.8	21	15.0
不 慮 の 事 故 (6)	45	31.9	3.1	59	45.1	3.9	△ 14	△ 13.2
自 殺 (7)	34	24.1	2.3	53	37.3	3.5	△ 19	△ 13.2
大動脈瘤および解離 (8)	25	17.7	1.7	23	16.2	1.5	2	1.5
慢性閉塞性肺疾患 (9)	24	17.0	1.6	20	14.1	1.3	4	2.9
糖 尿 病 (10)	20	14.2	1.4	22	15.5	1.4	△ 2	△ 1.3
	女							
全 死 因	1,470	939.0	100.0	1,365	864.3	100.0	105	74.7
悪 性 新 生 物 (1)	364	232.5	24.8	351	222.2	25.7	13	10.3
心 疾 患 (2)	235	150.1	16.0	222	140.6	16.3	13	9.5
脳 血 管 疾 患 (3)	182	116.3	12.4	171	108.3	12.5	11	8.0
老 衰 (4)	136	86.9	9.3	116	73.4	8.5	20	13.5
肺 炎 (5)	114	72.8	7.8	124	78.5	9.1	△ 10	△ 5.7
不 慮 の 事 故 (6)	34	21.7	2.3	33	20.9	2.4	1	0.8
腎 不 全 (7)	25	16.0	1.7	26	16.5	1.9	△ 1	△ 0.5
大動脈瘤および解離 (8)	21	13.4	1.4	19	12.0	1.4	2	1.4
糖 尿 病 (9)	18	11.5	1.2	15	9.5	1.1	3	2.0
自 殺 (10)	15	9.6	1.0	21	15.9	1.5	△ 6	△ 6.3

注：1) ()内の数字は死因順位を示す。

2) 「心疾患」は、「心疾患(高血圧性を除く)」である。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移 (総数)

年齢階級	総 数									
	昭和55年	平成2年	12年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	対前年増減 (27年-26年)
	死 亡 数									
総 数	1 080	1 293	1 843	2 526	2 769	2 798	2 723	2 887	2 945	58
0～4歳	49	14	5	8	12	10	7	8	9	1
5～9	9	2	1	3	2	-	1	1	-	△
10～14	3	-	1	4	4	3	-	1	1	0
15～19	8	7	5	3	4	3	6	5	2	△
20～24	8	8	9	10	9	10	4	6	3	△
25～29	17	5	8	6	6	10	7	5	9	4
30～34	17	6	12	7	15	12	15	14	9	△
35～39	19	19	21	24	22	17	14	17	11	△
40～44	26	23	12	24	28	26	20	21	25	4
45～49	33	38	37	41	42	29	35	41	28	△
50～54	45	51	72	64	59	56	46	72	56	△
55～59	75	76	89	98	106	81	66	78	75	△
60～64	93	94	108	150	147	145	158	141	130	△
65～69	118	126	185	187	178	175	163	181	207	26
70～74	154	161	240	208	233	249	229	266	225	△
75～79	169	225	290	373	357	370	317	322	349	27
80～84	130	203	255	448	483	489	526	505	508	3
85～89	72	146	283	415	521	574	538	596	618	22
90～94	30	67	163	272	348	332	359	407	450	43
95～99	4	21	40	149	158	163	170	168	179	11
100歳以上	1	1	7	32	35	44	42	32	51	19

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移 (男)

年齢階級	男										
	昭和55年	平成2年	12年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	対前年増減 (27年-26年)	
	死 亡 数										
総 数	567	697	1 027	1 334	1 497	1 460	1 374	1 522	1 475	△	47
0～4歳	31	8	3	4	5	7	7	3	6		3
5～9	5	1	1	1	1	-	1	1	-	△	1
10～14	1	-	1	3	4	3	-	-	-		-
15～19	7	5	-	3	3	2	5	4	-	△	4
20～24	6	5	7	5	9	8	3	5	2	△	3
25～29	10	4	7	6	5	7	6	3	8		5
30～34	8	3	9	4	10	7	9	12	7	△	5
35～39	12	11	12	16	15	12	10	11	5	△	6
40～44	16	14	5	14	21	17	12	16	15	△	1
45～49	20	25	18	32	26	18	22	26	16	△	10
50～54	28	30	45	37	46	36	25	51	36	△	15
55～59	38	49	62	69	79	56	43	49	45	△	4
60～64	54	65	78	101	95	94	111	95	79	△	16
65～69	68	76	129	121	111	121	105	125	144		19
70～74	80	91	169	144	150	164	143	184	142	△	42
75～79	94	125	164	220	225	230	188	213	198	△	15
80～84	56	99	127	241	289	284	300	271	282		11
85～89	23	62	119	182	251	259	242	280	296		16
90～94	9	18	59	90	99	93	96	133	151		18
95～99	1	5	11	33	46	37	38	37	33	△	4
100歳以上	-	1	1	8	7	5	8	3	10		7

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第2表 性・年齢階級別にみた死亡数の年次推移 (女)

年齢階級	女										
	昭和55年	平成2年	12年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	対前年増減 (27年-26年)	
	死 亡 数										
総 数	513	596	816	1 192	1 272	1 338	1 349	1 365	1 470		105
0～4歳	18	6	2	4	7	3	-	5	3	△	2
5～9	4	1	-	2	1	-	-	-	-		-
10～14	2	-	-	1	-	-	-	1	1		0
15～19	1	2	5	-	1	1	1	1	2		1
20～24	2	3	2	5	-	2	1	1	1		0
25～29	7	1	1	-	1	3	1	2	1	△	1
30～34	9	3	3	3	5	5	6	2	2		0
35～39	7	8	9	8	7	5	4	6	6		0
40～44	10	9	7	10	9	9	8	5	10		5
45～49	13	13	19	9	16	11	13	15	12	△	3
50～54	17	21	27	27	13	20	21	21	20	△	1
55～59	37	27	27	29	27	25	23	29	30		1
60～64	39	29	30	49	52	51	47	46	51		5
65～69	50	50	56	66	67	54	58	56	63		7
70～74	74	70	71	64	83	85	86	82	83		1
75～79	75	100	126	153	132	140	129	109	151		42
80～84	74	104	128	207	194	205	226	234	226	△	8
85～89	49	84	164	233	270	315	296	316	322		6
90～94	21	49	104	182	249	239	263	274	299		25
95～99	3	16	29	116	112	126	132	131	146		15
100歳以上	1	-	6	24	28	39	34	29	41		12

注：総数は、年齢不詳を含む。

(死亡) 第3表-1 死亡の場所別にみた死亡数の年次推移

年次	総数	施設内					施設外	
		病院	診療所	介護老人 保健施設	助産所	老人 ホーム	自宅	その他
		死 亡 数						
昭和55年	1 080	684	69	・	-	・	327	・
60	1 174	884	55	・	-	・	197	38
平成元年	1 232	970	45	-	-	・	178	39
2	1 293	1 054	43	1	-	・	159	36
3	1 332	1 081	34	2	-	・	165	50
4	1 464	1 185	31	3	-	・	194	51
5	1 685	1 395	23	3	-	・	208	56
6	1 625	1 293	36	7	-	・	235	54
7	1 690	1 410	37	4	-	8	178	53
8	1 694	1 393	25	6	-	21	199	50
9	1 734	1 453	37	14	-	9	181	40
10	1 753	1 449	32	8	-	7	209	48
11	1 984	1 641	39	12	-	12	221	59
12	1 843	1 520	38	8	-	5	221	51
13	1 905	1 583	37	21	-	10	204	50
14	1 924	1 587	42	14	-	11	210	60
15	1 945	1 605	31	13	-	7	223	66
16	1 985	1 583	33	23	-	17	256	73
17	2 128	1 735	38	22	-	20	251	62
18	2 312	1 859	40	28	-	16	288	81
19	2 384	1 912	35	27	-	31	323	56
20	2 501	1 978	41	45	-	29	337	71
21	2 524	1 980	37	64	-	45	332	66
22	2 526	1 962	34	51	-	58	353	68
23	2 769	2 084	60	82	-	71	386	86
24	2 798	2 111	40	85	-	115	377	70
25	2 723	2 020	38	95	-	150	363	57
26	2 887	2 154	47	85	-	157	385	59
27	2 945	2 181	39	103	-	186	369	67

注：1) 平成6年以前は、老人ホームでの死亡が自宅又はその他に含まれている。

2) 昭和55年については、「施設外」の内訳を集計していないので、「自宅」に「施設外」の死亡数を計上した。

(死亡) 第3表-2 死亡の場所別にみた構成割合の年次推移

年次	総数	施設内					施設外	
		病院	診療所	介護老人 保健施設	助産所	老人 ホーム	自宅	その他
構成割合 (%)								
昭和55年	100.0	63.3	6.4	・	-	・	30.3	・
60	100.0	75.3	4.7	・	-	・	16.8	3.2
平成元年	100.0	78.7	3.7	-	-	・	14.4	3.2
2	100.0	81.5	3.3	0.1	-	・	12.3	2.8
3	100.0	81.2	2.6	0.2	-	・	12.4	3.8
4	100.0	80.9	2.1	0.2	-	・	13.3	3.5
5	100.0	82.8	1.4	0.2	-	・	12.3	3.3
6	100.0	79.6	2.2	0.4	-	・	14.5	3.3
7	100.0	83.4	2.2	0.2	-	0.5	10.5	3.1
8	100.0	82.2	1.5	0.4	-	1.2	11.7	3.0
9	100.0	83.8	2.1	0.8	-	0.5	10.4	2.3
10	100.0	82.7	1.8	0.5	-	0.4	11.9	2.7
11	100.0	82.7	2.0	0.6	-	0.6	11.1	3.0
12	100.0	82.5	2.1	0.4	-	0.3	12.0	2.8
13	100.0	83.1	1.9	1.1	-	0.5	10.7	2.6
14	100.0	82.5	2.2	0.7	-	0.6	10.9	3.1
15	100.0	82.5	1.6	0.7	-	0.4	11.5	3.4
16	100.0	79.7	1.7	1.2	-	0.9	12.9	3.7
17	100.0	81.5	1.8	1.0	-	0.9	11.8	2.9
18	100.0	80.4	1.7	1.2	-	0.7	12.5	3.5
19	100.0	80.2	1.5	1.1	-	1.3	13.5	2.3
20	100.0	79.1	1.6	1.8	-	1.2	13.5	2.8
21	100.0	78.4	1.5	2.5	-	1.8	13.2	2.6
22	100.0	77.7	1.3	2.0	-	2.3	14.0	2.7
23	100.0	75.3	2.2	3.0	-	2.6	13.9	3.1
24	100.0	75.4	1.4	3.0	-	4.1	13.5	2.5
25	100.0	74.2	1.4	3.5	-	5.5	13.3	2.1
26	100.0	74.6	1.6	2.9	-	5.4	13.3	2.0
27	100.0	74.1	1.3	3.5	-	6.3	12.5	2.3

注：1) 平成6年以前は、老人ホームでの死亡が自宅又はその他に含まれている。

2) 昭和55年については、「施設外」の内訳を集計していないので、「自宅」に「施設外」の死亡数を計上した。

(死亡) 第4表 死因順位(第5位まで)別にみた死亡数・死亡率(人口10万対)の年次推移

年次	第1位			第2位			第3位		
	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率
昭和55年	悪性新生物	258	112.6	脳血管疾患	237	103.4	心疾患	178	77.7
60	悪性新生物	300	127.4	心疾患	229	97.3	脳血管疾患	209	88.8
平成元年	悪性新生物	345	149.4	心疾患	244	105.6	脳血管疾患	189	81.8
2	悪性新生物	383	162.7	心疾患	255	108.3	脳血管疾患	158	67.1
3	悪性新生物	392	166.2	心疾患	253	107.3	脳血管疾患	202	85.6
4	悪性新生物	392	139.1	心疾患	280	99.3	脳血管疾患	253	89.8
5	悪性新生物	438	154.6	心疾患	327	115.4	脳血管疾患	259	91.4
6	悪性新生物	434	152.3	心疾患	295	103.5	脳血管疾患	236	82.8
7	悪性新生物	547	190.9	脳血管疾患	271	94.6	心疾患	240	83.8
8	悪性新生物	532	185.2	脳血管疾患	267	92.9	心疾患	254	88.4
9	悪性新生物	530	184.4	脳血管疾患	310	107.9	心疾患	232	80.7
10	悪性新生物	535	185.9	脳血管疾患	295	102.5	心疾患	265	92.1
11	悪性新生物	614	213.5	脳血管疾患	325	113.0	心疾患	293	101.9
12	悪性新生物	588	203.6	脳血管疾患	289	100.1	心疾患	246	85.2
13	悪性新生物	605	209.6	脳血管疾患	327	113.3	心疾患	273	94.6
14	悪性新生物	653	226.3	脳血管疾患	305	105.7	心疾患	267	92.5
15	悪性新生物	633	219.7	脳血管疾患	323	112.1	心疾患	257	89.2
16	悪性新生物	616	213.9	心疾患	322	111.8	脳血管疾患	285	99.0
17	悪性新生物	671	233.6	脳血管疾患	310	107.9	心疾患	294	102.4
18	悪性新生物	709	236.2	脳血管疾患	406	135.3	心疾患	329	109.6
19	悪性新生物	721	240.6	心疾患	370	123.4	脳血管疾患	358	119.4
20	悪性新生物	779	260.8	脳血管疾患	384	128.6	心疾患	366	122.5
21	悪性新生物	773	259.1	心疾患	363	121.7	脳血管疾患	353	118.3
22	悪性新生物	806	270.2	心疾患	399	133.7	脳血管疾患	284	95.2
23	悪性新生物	833	278.1	心疾患	427	142.5	脳血管疾患	359	119.8
24	悪性新生物	818	272.6	心疾患	476	158.6	脳血管疾患	329	109.6
25	悪性新生物	783	260.5	心疾患	423	140.7	脳血管疾患	326	108.5
26	悪性新生物	830	276.6	心疾患	443	147.6	脳血管疾患	356	118.6
27	悪性新生物	810	272.1	心疾患	456	153.2	脳血管疾患	351	117.9

注：脳血管疾患の平成6年から平成7年にかけての増加は、平成7年1月からのICD-10の適用による死因選択ルールの明確化によるものと考えられる。

1) 昭和55年については「肺炎」だけの集計がないので、第4位は「肺炎及び気管支炎」としている。

年次	第 4 位			第 5 位		
	死 因	死亡数	死亡率	死 因	死亡数	死亡率
昭和55年	肺炎及び気管支炎	80	34.9	不慮の事故	43	18.8
60	肺 炎	86	36.5	自 殺	49	20.8
平成元年	肺 炎	104	45.0	不慮の事故	46	19.9
2	肺 炎	137	58.2	不慮の事故	60	25.5
3	肺 炎	127	53.8	不慮の事故	53	22.5
4	肺 炎	137	48.6	不慮の事故	62	22.0
5	肺 炎	199	70.2	不慮の事故	77	27.2
6	肺 炎	190	66.7	不慮の事故	72	25.3
7	肺 炎	154	53.8	不慮の事故	73	25.5
8	肺 炎	144	50.1	不慮の事故	67	23.3
9	肺 炎	148	51.5	不慮の事故	82	28.5
10	肺 炎	132	45.9	自 殺	74	25.7
11	肺 炎	173	60.2	不慮の事故	66	22.9
12	肺 炎	172	59.5	不慮の事故	73	25.3
13	肺 炎	160	55.4	自 殺	71	24.6
14	肺 炎	152	52.7	不慮の事故	73	25.3
15	肺 炎	172	59.7	自 殺	71	24.6
16	肺 炎	169	58.7	不慮の事故	78	27.1
17	肺 炎	218	75.9	不慮の事故	67	23.3
18	肺 炎	225	75.0	自 殺	89	29.7
19	肺 炎	250	83.4	自 殺	76	25.4
20	肺 炎	258	86.4	自 殺	88	29.5
21	肺 炎	260	87.2	不慮の事故	90	30.2
22	肺 炎	231	77.4	不慮の事故	73	24.5
23	肺 炎	271	90.5	不慮の事故	104	34.7
24	肺 炎	241	80.3	老 衰	135	45
25	肺 炎	252	83.8	老 衰	157	52.2
26	肺 炎	285	95.0	老 衰	143	47.6
27	肺 炎	245	82.3	老 衰	184	61.8

第5表-1 選択死因分類別にみた性別死亡数の年次推移

選択死因分類コード・性		平成7年	10	13	16	19	22	23	24	25	26	27
全 死 因	男	1 690	1 753	1 905	1 985	2 384	2526	2769	2798	2723	2887	2945
	女	939	970	1 036	1 089	1 312	1334	1497	1460	1374	1522	1475
Se 01 結 核	男	2	4	2	7	2	3	1	2	3	2	2
	女	1	3	1	4	1	-	1	2	-	1	-
Se 02 悪 性 新 生 物	男	547	535	605	616	721	806	833	818	783	830	810
	女	335	325	370	359	443	469	479	479	438	479	446
(再掲)		212	210	235	257	278	337	354	339	345	351	364
Se 03 食 道	男	20	20	21	23	26	21	37	22	27	18	27
	女	18	18	19	19	24	17	31	18	21	15	18
Se 04 胃	男	2	2	2	4	2	4	6	4	6	3	9
	女	88	84	81	80	93	109	90	97	89	100	85
Se 05 結 腸	男	56	58	55	48	57	76	57	62	64	62	52
	女	32	26	26	32	36	33	33	35	25	38	33
Se 06 直腸S状結腸移行部 及び直腸	男	46	62	66	70	65	85	86	93	102	81	84
	女	23	38	34	33	34	45	46	43	53	36	40
Se 07 肝及び肝内胆管	男	23	24	32	37	31	40	40	50	49	45	44
	女	27	33	39	37	37	29	37	41	35	43	47
Se 08 胆のう及びその他の胆道	男	16	22	28	21	24	15	18	25	27	30	24
	女	11	11	11	16	13	14	19	16	8	13	23
Se 09 膵	男	53	41	48	42	44	72	53	68	61	51	60
	女	38	31	33	26	27	44	31	38	40	33	43
Se 10 気管、気管支及び肺	男	15	10	15	16	17	28	22	30	21	18	17
	女	30	33	19	37	35	42	53	37	47	45	34
Se 11 乳 房	男	15	15	9	23	24	21	25	14	22	21	20
	女	15	18	10	14	11	21	28	23	25	24	14
Se 12 子 宮	男	37	31	48	44	53	58	72	71	76	76	78
	女	24	12	20	21	37	32	42	39	41	39	44
Se 13 白 血 病	男	13	19	28	23	16	26	30	32	35	37	34
	女	82	90	99	104	131	135	127	137	113	163	138
Se 14 糖 尿 病	男	56	70	72	70	105	100	93	101	76	112	96
	女	26	20	27	34	26	35	34	36	37	51	42
Se 15 高血圧性疾患	男	20	22	23	28	28	38	34	28	36	34	26
	女	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Se 16 心疾患(高血圧性を除く)	男	19	22	22	28	28	38	33	28	36	34	25
	女	9	11	11	7	22	19	13	10	14	15	19
Se 17 急性心筋梗塞	男	9	11	11	7	22	19	13	10	14	15	19
	女	9	11	11	7	22	19	13	10	14	15	19
Se 18 その他の虚血性心疾患	男	15	12	17	7	14	14	18	9	14	14	17
	女	6	4	10	4	8	9	11	7	7	8	9
Se 19 不整脈及び伝導障害	男	9	8	7	3	6	5	7	2	7	6	8
	女	28	18	17	32	30	58	47	35	45	37	38
Se 20 心 不 全	男	15	7	11	16	16	28	34	21	18	22	20
	女	13	11	6	16	14	30	13	14	27	15	18
(再掲)	男	12	12	16	9	22	14	17	15	14	7	12
	女	4	5	4	5	9	8	6	5	3	1	4
Se 17 急性心筋梗塞	男	8	7	12	4	13	6	11	10	11	6	8
	女	240	265	273	322	370	399	427	476	423	443	456
Se 18 その他の虚血性心疾患	男	126	144	140	174	189	195	227	217	185	221	221
	女	114	121	133	148	181	204	200	259	238	222	235
Se 19 不整脈及び伝導障害	男	82	77	77	91	63	63	68	61	74	69	58
	女	46	40	46	55	32	40	40	34	43	38	33
Se 20 心 不 全	男	36	37	31	36	31	23	28	27	31	31	25
	女	34	27	25	33	32	48	42	32	30	24	32
(再掲)	男	17	14	18	17	22	29	25	15	12	17	18
	女	17	13	7	16	10	19	17	17	18	7	14
Se 19 不整脈及び伝導障害	男	28	70	64	93	109	122	133	162	145	178	173
	女	12	44	32	54	67	64	85	96	70	99	103
Se 20 心 不 全	男	16	26	32	39	42	58	48	66	75	79	70
	女	56	60	68	62	123	123	132	179	126	122	150
(再掲)	男	30	25	28	22	47	39	56	52	37	43	48
	女	26	35	40	40	76	84	76	127	89	79	102

選択死因分類コード・性	平成7年	10	13	16	19	22	23	24	25	26	27
Se 21 脳血管疾患	271	295	327	285	358	284	359	329	326	356	351
男女	135 136	137 158	145 182	148 137	171 187	148 136	165 194	171 158	162 164	185 171	169 182
(再掲) Se 22 くも膜下出血	23	41	30	35	30	29	34	30	27	37	39
男女	8 15	16 25	6 24	13 22	9 21	12 17	12 22	10 20	13 14	18 19	13 26
Se 23 脳内出血	62	85	103	103	137	100	113	112	104	141	124
男女	34 28	45 40	46 57	64 39	69 68	57 43	60 53	61 51	58 46	83 58	66 58
Se 24 脳梗塞	174	166	192	144	189	148	210	183	183	172	183
男女	86 88	76 90	92 100	69 75	93 96	73 75	91 119	98 85	89 94	80 92	87 96
Se 25 大動脈瘤及び解離	18	20	26	28	29	35	30	32	32	42	46
男女	11 7	14 6	18 8	13 15	20 9	24 11	20 10	15 17	18 14	23 19	25 21
Se 26 肺炎	154	132	160	169	250	231	271	241	252	285	245
男女	71 83	75 57	81 79	84 85	120 130	124 107	140 131	121 120	140 112	161 124	131 114
Se 27 慢性閉塞性肺疾患	16	14	18	13	28	30	34	33	27	23	27
男女	13 3	10 4	15 3	11 2	22 6	25 5	30 4	28 5	23 4	20 3	24 3
Se 28 喘息	7	5	6	3	-	2	3	5	3	1	1
男女	2 5	2 3	5 1	1 2	- -	- 2	1 2	3 2	- 3	- 1	- 1
Se 29 肝疾患	21	28	38	20	23	27	39	29	29	21	30
男女	18 3	21 7	23 15	16 4	15 8	20 7	21 18	16 13	17 12	15 6	18 12
Se 30 腎不全	27	38	37	45	43	55	56	48	53	55	43
男女	11 16	18 20	15 22	18 27	22 21	26 29	33 23	22 26	29 24	29 26	18 25
Se 31 老衰	19	13	22	24	25	62	86	135	157	143	184
男女	8 11	4 9	4 18	6 18	9 16	17 45	25 61	31 104	36 121	27 116	48 136
Se 32 不慮の事故	73	65	65	78	71	73	104	89	67	92	79
男女	44 29	34 31	48 17	51 27	50 21	32 41	56 48	49 40	41 26	59 33	45 34
(再掲) Se 33 交通事故	22	19	22	25	15	9	12	11	15	12	10
男女	16 6	11 8	17 5	14 11	10 5	4 5	6 6	7 4	10 5	7 5	6 4
Se 34 自殺	40	74	71	76	76	68	59	69	60	74	49
男女	29 11	57 17	47 24	52 24	61 15	43 25	44 15	47 22	41 19	53 21	34 15

注：1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 平成7年以降は、死因について「選択死因分類」を使用している。

(死亡) 第5表-2 主な死因簡単分類別にみた性別死亡数の年次推移

簡単分類番号・死因・性		昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
全	死	1 080	1 174	1 232	1 293	1 332	1 464	1 685	1 625
	因	...	653	666	697	742	806	947	885
4, 72	胃腸炎	男女	521	566	596	590	658	738	740
		男女	...	1	1	-	3	2	2
5, 6	全結核	男女	...	1	1	-	2	1	-
		男女	...	1	1	-	1	1	2
28-37	悪性新生物	男女	9	6	1	1	2	2	6
		男女	...	5	1	-	1	1	2
28	食道	男女	...	1	-	1	1	-	1
		男女	258	300	345	383	392	392	438
29	胃	男女	...	184	192	211	229	216	273
		男女	...	116	153	172	163	176	165
30	大腸	男女	...	10	15	12	20	22	11
		男女	...	9	10	11	16	17	9
31	結腸	男女	...	1	5	1	4	5	2
		男女	...	66	69	76	62	65	86
32	肝	男女	...	44	41	46	42	42	56
		男女	...	22	28	30	20	23	30
33	肺	男女	48	63	53	72
		男女	21	32	24	43
34	気管、気管支及び肺	男女	27	31	29	17
		男女	...	19	19	17	15	23	23
35	乳房	男女	...	10	13	8	11	9	16
		男女	...	9	6	9	4	14	7
36	子宮	男女	31	48	30	49
		男女	13	21	15	27
37	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	男女	18	27	15	22
		男女	...	24	29	35	42	27	35
38	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	男女	...	17	20	23	28	23	26
		男女	...	7	9	12	14	4	9
39	糖尿病	男女	...	17	21	23	25	35	22
		男女	...	9	13	11	10	20	14
40	心疾患	男女	...	8	8	12	15	15	8
		男女	...	46	53	57	65	66	78
41	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	男女	...	38	40	39	46	47	57
		男女	...	8	13	18	19	19	21
42	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	男女	...	10	21	19	12	18	15
		男女	...	-	1	-	-	-	-
43	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	男女	...	10	20	19	12	18	15
		男女	...	12	10	5	11	9	10
44	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	男女	...	12	10	5	11	9	10
		男女	...	8	8	6	10	7	10
45	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	男女	...	4	5	4	5	2	5
		男女	...	4	3	2	5	5	5
46	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	男女	...	88	100	133	130	120	148
		男女	...	53	49	69	71	56	90
47	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	男女	...	35	51	64	59	64	58
		男女	...	17	16	20	12	19	22
48	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	男女	...	10	12	4	7	9	11
		男女	...	6	8	8	12	7	11
49	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	男女	178	229	244	255	253	280	327
		男女	...	124	125	135	132	157	171
50	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	男女	...	105	119	120	121	123	156
		男女	...	81	77	68	81	77	99
51	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	男女	...	54	43	44	46	47	48
		男女	...	27	34	24	35	30	51
52	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	男女	...	8	16	8	8	12	14
		男女	...	1	5	3	3	5	6
53	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	男女	...	7	11	5	5	7	8
		男女	...	7	11	5	5	7	8

注：1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 昭和55年については、市町村別集計において男女別の集計をしていないので不明とした。

3) 平成6年以前は、死因について「簡単分類番号」を使用している。

简单分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
48, 49 高血圧性疾患	17	13	15	9	7	14	7	11
男女	…	2	8	4	2	5	3	6
	…	11	7	5	5	9	4	5
48 高血圧性心疾患	…	7	11	7	4	11	5	8
男女	…	2	6	4	2	5	2	5
	…	5	5	3	2	6	3	3
58-60 脳血管疾患	237	209	189	158	202	253	259	236
男女	…	103	85	73	98	111	133	96
	…	106	104	85	104	142	126	140
62, 63, 66 肺炎及び気管支炎	80	91	107	142	135	143	211	196
男女	…	55	61	82	75	87	117	102
	…	36	46	60	60	56	94	94
63 肺炎	…	86	104	137	127	137	199	190
男女	…	52	60	80	71	81	112	97
	…	34	44	57	56	56	87	93
69 胃及び十二指腸潰瘍	…	10	7	7	2	6	12	8
男女	…	6	4	2	1	4	5	4
	…	4	3	5	1	2	7	4
73 慢性肝疾患及び肝硬変	19	16	24	18	19	19	20	23
男女	…	14	18	13	10	15	14	18
	…	2	6	5	9	4	6	5
76, 77 腎炎ネフローゼ症候群及びネフローゼ	12	14	34	29	33	46	48	40
男女	…	3	20	11	19	24	26	20
	…	11	14	18	14	22	22	20
88 精神病の記載のない老衰	18	16	15	17	12	13	22	16
男女	…	4	2	5	5	3	7	7
	…	12	13	12	7	10	15	9
E104-E114 不慮の事故及び有害作用	43	37	46	60	53	62	77	72
男女	…	28	33	40	41	44	56	49
	…	9	13	20	12	18	21	23
E104 自動車事故	…	12	17	28	28	29	44	27
男女	…	9	13	18	22	19	35	19
	…	3	4	10	6	10	9	8
E105 自動車事故以外の交通事故	…	2	2	4	-	5	-	-
男女	…	2	2	4	-	3	-	-
	…	-	-	-	-	2	-	-
E108 火災及び火焰による不慮の事故	…	2	-	1	3	2	3	5
男女	…	1	-	1	2	1	1	2
	…	1	-	-	1	1	2	3
E110 不慮の溺死	…	7	2	3	7	6	6	3
男女	…	6	2	1	5	5	5	3
	…	1	-	2	2	1	1	-
E115 自殺	38	49	36	36	41	42	36	41
男女	…	28	26	21	25	29	23	26
	…	21	10	15	16	13	13	15

(死亡) 第6表-1 選択死因分類別にみた性別死亡率(人口10万対)の年次推移

選択死因分類コード・性	平成7年	10	13	16	19	22	23	24	25	26	27
全 死 因	589.9	609.0	660.0	689.3	795.4	846.7	924.3	932.3	905.9	962.0	989.5
男	684.2	702.5	748.6	791.2	919.0	942.3	1054.3	1026.9	965.0	1070.5	1045.4
女	503.2	522.8	578.3	596.0	683.0	760.3	807.2	847.2	852.6	864.3	939.0
Se 01 結 核	0.7	1.4	0.7	2.4	0.7	1.0	0.3	0.7	1.0	0.7	0.7
男	0.7	2.2	0.7	2.9	0.7	-	0.7	1.4	-	0.7	-
女	0.7	0.7	0.7	2.0	0.6	1.9	-	-	1.9	0.6	1.3
Se 02 悪 性 新 生 物	190.9	185.9	209.6	213.9	240.6	270.2	278.1	272.6	260.5	276.6	272.1
男	244.1	235.4	267.4	260.8	310.3	331.3	337.3	336.9	307.6	336.9	316.1
女	142.1	140.2	156.4	170.9	177.1	214.9	224.7	214.7	218.1	222.2	232.5
(再掲) Se 03 食 道	7.0	6.9	7.3	8.0	8.7	7.0	12.4	7.3	9.0	6.0	9.1
男	13.1	13.0	13.7	13.8	16.8	12.0	21.8	12.7	14.7	10.6	12.8
女	1.3	1.3	1.3	2.7	1.3	2.6	3.8	2.5	3.8	1.9	5.7
Se 04 胃	30.7	29.2	28.1	27.8	31.0	36.5	30.0	32.3	29.6	33.3	28.6
男	40.8	42.0	39.7	34.9	39.9	53.7	40.1	43.6	45.0	43.6	36.9
女	21.4	17.4	17.3	21.3	22.9	21.0	20.9	22.2	15.8	24.1	21.1
Se 05 結 腸	16.1	21.5	22.9	24.3	21.7	28.5	28.7	31.0	33.9	27.0	28.2
男	16.8	27.5	24.6	24.0	23.8	31.8	32.4	30.2	37.2	25.3	28.4
女	15.4	16.0	21.3	24.6	19.7	25.5	25.4	31.7	31.0	28.5	28.1
Se 06 直腸S状結腸移行部 及び直腸	9.4	11.5	13.5	12.8	12.3	9.7	12.4	13.7	11.6	14.3	15.8
男	11.7	15.9	20.2	15.3	16.8	10.6	12.7	17.6	19.0	21.1	17.0
女	7.4	7.3	7.3	10.6	8.3	8.9	12.1	10.1	5.1	8.2	14.7
Se 07 肝及び肝内胆管	18.5	14.2	16.6	14.6	14.7	24.1	17.7	22.7	20.3	17.0	20.2
男	27.7	22.5	23.8	18.9	18.9	31.1	21.8	26.7	28.1	23.2	30.5
女	10.1	6.7	10.0	10.6	10.8	17.9	14.0	19.0	13.3	11.4	10.9
Se 08 胆のう及びその他の胆道	10.5	11.5	6.6	12.8	11.7	14.1	17.7	12.3	15.6	15.0	11.4
男	10.9	10.9	6.5	16.7	16.8	14.8	17.6	9.8	15.5	14.8	14.2
女	10.1	12.0	6.7	9.3	7.0	13.4	17.8	14.6	15.8	15.2	8.9
Se 09 膵	12.9	10.8	16.6	15.3	17.7	19.4	24.0	23.7	25.3	25.3	26.2
男	17.5	8.7	14.5	15.3	25.9	22.6	29.6	27.4	28.8	27.4	31.2
女	8.7	12.7	18.6	15.3	10.2	16.6	19.0	20.3	22.1	23.4	21.7
Se 10 気管、気管支及び肺	28.6	31.3	34.3	36.1	43.7	45.2	42.4	45.7	37.6	54.3	46.4
男	40.8	50.7	52.0	50.9	73.5	70.6	65.5	71.0	53.4	78.8	68.0
女	17.4	13.4	18.0	22.6	16.6	22.3	21.6	22.8	23.4	32.3	26.8
Se 11 乳 房	7.0	7.6	8.0	9.7	9.3	12.7	11.3	9.3	12.0	11.3	8.7
男	0.7	-	0.7	-	-	-	0.7	-	-	-	0.7
女	12.7	14.7	14.6	18.6	17.8	24.2	20.9	17.7	22.8	21.5	16.0
Se 12 子 宮	3.1	3.8	3.8	2.4	7.3	6.4	4.3	3.3	4.7	5.0	6.4
女	6.0	7.3	7.3	4.7	14.0	12.1	8.3	6.3	8.8	9.5	12.1
Se 13 白 血 病	5.2	4.2	5.9	2.4	4.7	4.7	6.0	3.0	4.7	4.7	5.7
男	4.4	2.9	7.2	2.9	5.6	6.4	7.7	4.9	4.9	5.6	6.4
女	6.0	5.3	4.7	2.0	3.8	3.2	4.4	1.3	4.4	3.8	5.1
Se 14 糖 尿 病	9.8	6.3	5.9	11.1	10.0	19.4	15.7	11.7	15.0	12.3	12.8
男	10.9	5.1	7.9	11.6	11.2	19.8	23.9	14.8	12.6	15.5	14.2
女	8.7	7.3	4.0	10.6	8.9	19.1	8.3	8.9	17.1	9.5	11.5
Se 15 高 血 圧 性 疾 患	4.2	4.2	5.5	3.1	7.3	4.7	5.7	5.0	4.7	2.3	4.0
男	2.9	3.6	2.9	3.6	6.3	5.7	4.2	3.5	2.1	0.7	2.8
女	5.4	4.7	8.0	2.7	8.3	3.8	7.0	6.3	7.0	3.8	5.1
Se 16 心疾患(高血圧性を除く)	83.8	92.1	94.6	111.8	123.4	133.7	142.5	158.6	140.7	147.6	153.2
男	91.8	104.3	101.2	126.4	132.4	137.7	159.9	152.3	129.9	155.4	156.6
女	76.4	80.8	88.5	98.4	115.3	130.1	126.9	164.0	150.4	140.6	150.1
(再掲) Se 17 急 性 心 筋 梗 塞	28.6	26.8	26.7	31.6	21.0	21.1	22.7	20.3	24.6	23.0	19.5
男	33.5	29.0	33.2	40.0	22.4	28.3	28.2	23.9	30.2	26.7	23.4
女	24.1	24.7	20.6	23.9	19.7	14.7	17.8	17.1	19.6	19.6	16.0
Se 18 その他の虚血性心疾患	11.9	9.4	8.7	11.5	10.7	16.1	14.0	10.7	10.0	8.0	10.8
男	12.4	10.1	13.0	12.4	15.4	20.5	17.6	10.6	8.4	12.0	12.8
女	11.4	8.7	4.7	10.6	6.4	12.1	10.8	10.8	11.4	4.4	8.9
Se 19 不整脈及び伝導障害	9.8	24.3	22.2	32.3	36.4	40.9	44.4	54.0	48.2	59.3	58.1
男	8.7	31.9	23.1	39.2	46.9	45.2	59.9	67.5	49.2	69.6	73.0
女	10.7	17.4	21.3	25.9	26.8	37.0	30.5	41.8	47.4	50.0	44.7
Se 20 心 不 全	19.5	20.8	23.6	21.5	41.0	41.2	44.1	59.6	41.9	40.7	50.4
男	21.9	18.1	20.2	16.0	32.9	27.5	39.4	36.6	26.0	30.2	34.0
女	17.4	23.4	26.6	26.6	48.4	53.6	48.2	80.4	56.3	50.0	65.2

選択死因分類コード・性	平成7年	10	13	16	19	22	23	24	25	26	27
Se 21 脳血管疾患	94.6	102.5	113.3	99.0	119.4	95.2	119.8	109.6	108.5	118.6	117.9
男女	98.4 91.1	99.2 105.5	104.8 121.1	107.5 91.1	119.8 119.1	104.5 86.7	116.2 123.1	120.3 100.0	113.8 103.7	130.1 108.3	119.8 116.3
(再掲) Se 22 くも膜下出血	8.0	14.2	10.4	12.2	10.0	9.7	11.3	10.0	9.0	12.3	13.1
男女	5.8 10.1	11.6 16.7	4.3 16.0	9.4 14.6	6.3 13.4	8.5 10.8	8.5 14.0	7.0 12.7	9.1 8.8	12.7 12.0	9.2 16.6
Se 23 脳内出血	21.6	29.5	35.7	35.8	45.7	33.5	37.7	37.3	34.6	47.0	41.7
男女	24.8 18.8	32.6 26.7	33.2 37.9	46.5 25.9	48.3 43.3	40.3 27.4	42.3 33.6	42.9 32.3	40.7 29.1	58.4 36.7	46.8 37.1
Se 24 脳梗塞	60.7	57.7	66.5	50.0	63.1	49.6	70.1	61.0	60.9	57.3	61.5
男女	62.7 59.0	55.0 60.1	66.5 66.5	50.1 49.9	65.1 61.2	51.6 47.8	64.1 75.5	68.9 53.8	62.5 59.4	56.3 58.3	61.7 61.3
Se 25 大動脈瘤及び解離	6.3	6.9	9.0	9.7	9.7	11.7	10.0	10.7	10.6	14.0	15.5
男女	8.0 4.7	10.1 4.0	13.0 5.3	9.4 10.0	14.0 5.7	17.0 7.0	14.1 6.3	10.6 10.8	12.6 8.8	16.2 12.0	17.7 13.4
Se 26 肺炎	53.8	45.9	55.4	58.7	83.4	77.4	90.5	80.3	83.8	95.0	82.3
男女	51.7 55.6	54.3 38.1	58.5 52.6	61.0 56.5	84.1 82.8	87.6 68.2	98.6 83.1	85.1 76.0	98.3 70.8	113.2 78.5	92.8 72.8
Se 27 慢性閉塞性肺疾患	5.6	4.9	6.2	4.5	9.3	10.1	11.3	11.0	9.0	7.7	9.1
男女	9.5 2.0	7.2 2.7	10.8 2.0	8.0 1.3	15.4 3.8	17.7 3.2	21.1 2.5	19.7 3.2	16.2 2.5	14.1 1.9	17.0 1.9
Se 28 喘息	2.4	1.7	2.1	1.0	-	0.7	1.0	1.7	1.0	0.3	0.3
男女	1.5 3.4	1.4 2.0	3.6 0.7	0.7 1.3	-	-	0.7 1.3	2.1 1.3	-	-	-
Se 29 肝疾患	7.3	9.7	13.2	6.9	7.7	9.0	13.0	9.7	9.6	7.0	10.1
男女	13.1 2.0	15.2 4.7	16.6 10.0	11.6 2.7	10.5 5.1	14.1 4.5	14.8 11.4	11.3 8.2	11.9 7.6	10.6 3.8	12.8 7.7
Se 30 腎不全	9.4	13.2	12.8	15.6	14.3	18.4	18.7	16.0	17.6	18.3	14.4
男女	8.0 10.7	13.0 13.4	10.8 14.6	13.1 18.0	15.4 13.4	18.4 18.5	23.2 14.6	15.5 16.5	20.4 15.2	20.4 16.5	12.8 16.0
Se 31 老衰	6.6	4.5	7.6	8.3	8.3	20.8	28.7	45.0	52.2	47.6	61.8
男女	5.8 7.4	2.9 6.0	2.9 12.0	4.4 12.0	6.3 10.2	12.0 28.7	17.6 38.7	21.8 65.9	25.3 76.5	19.0 73.4	34.0 86.9
Se 32 不慮の事故	25.5	22.6	22.5	27.1	23.7	24.5	34.7	29.7	22.3	30.7	26.5
男女	32.1 19.4	24.6 20.7	34.7 11.3	37.1 18.0	35.0 13.4	22.6 26.2	39.4 30.5	34.5 25.3	28.8 16.4	41.5 20.9	31.9 21.7
(再掲) Se 33 交通事故	7.7	6.6	7.6	8.7	5.0	3.0	4.0	3.7	5.0	4.0	3.4
男女	11.7 4.0	8.0 5.3	12.3 3.3	10.2 7.3	7.0 3.2	2.8 3.2	4.2 3.8	4.9 2.5	7.0 3.2	4.9 3.2	4.3 2.6
Se 34 自殺	14.0	25.7	24.6	26.4	25.4	22.8	19.7	23.0	20.0	24.7	16.5
男女	21.1 7.4	41.3 11.4	34.0 16.0	37.8 16.0	42.7 9.6	30.4 15.9	31.0 9.5	33.1 13.9	28.8 12.0	37.3 13.3	24.1 9.6

注：1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 平成7年以降は、死因について「選択死因分類」を使用している。

(死亡) 第6表-2 主な死因简单分類別にみた性別死亡率(人口10万対)の
年次推移

简单分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
全 死 因	471.4	498.6	533.4	549.2	564.7	519.4	594.6	570.4
男女	...	577.7	609.0	620.4	659.1	597.3	698.7	649.3
4,72	...	425.5	465.4	484.2	478.4	447.8	499.1	497.9
胃 腸 炎	...	0.4	0.4	...	1.3	0.7	0.7	0.7
男女	1.8	1.5	0.7	...
5,6	...	0.8	0.8	...	0.8	...	0.7	1.3
全 結 核	3.9	2.5	0.4	0.4	0.8	0.7	0.7	2.1
男女	...	4.4	0.9	...	0.9	0.7	1.5	3.7
28-37	...	0.8	...	0.8	0.8	0.7	...	0.7
悪 性 新 生 物	112.6	127.4	149.4	162.7	166.2	139.1	154.6	152.3
男女	...	162.8	175.6	187.8	203.4	160.1	201.4	195.9
28	...	94.7	125.8	139.7	132.2	119.8	111.6	112.4
食 道	...	4.2	6.5	5.1	8.5	7.8	3.9	4.2
男女	...	8.0	9.1	9.8	14.2	12.6	6.6	7.3
29	...	0.8	4.1	0.8	3.2	3.4	1.4	1.3
胃	...	28.0	29.9	32.3	26.3	23.1	30.3	29.8
男女	...	38.9	37.5	40.9	37.3	31.1	41.3	38.2
...	...	18.0	23.0	24.4	16.2	15.7	20.3	22.2
大 腸	20.4	26.7	18.8	25.4	18.3
男女	18.7	28.4	17.8	31.7	25.7
30	21.9	25.1	19.7	19.6	11.4
直腸, 直腸S状結腸移行部及 び肛門	...	8.1	8.2	7.2	6.4	8.2	8.1	5.6
男女	...	8.8	11.9	7.1	9.8	6.7	11.8	8.1
...	...	7.4	4.9	7.3	3.2	9.5	4.7	3.4
結 腸	13.2	20.3	10.6	17.3	12.6
男女	11.6	18.7	11.1	19.9	17.6
31	14.6	21.9	10.2	14.9	8.1
肝	...	10.2	12.6	14.9	17.8	9.6	12.4	13.3
男女	...	15.0	18.3	20.5	24.9	17.0	19.2	18.3
32	...	5.7	7.4	9.7	11.4	2.7	6.1	8.7
膵	...	7.2	9.1	9.8	10.6	12.4	7.8	8.1
男女	...	8.0	11.9	9.8	8.9	14.8	10.3	8.8
33	...	6.5	6.6	9.7	12.2	10.2	5.4	7.4
気管, 気管支及び肺	...	19.5	22.9	24.2	27.6	23.4	27.5	27.7
男女	...	33.6	36.6	34.7	40.9	34.8	42.1	42.6
34	...	6.5	10.7	14.6	15.4	12.9	14.2	14.1
乳 房	...	4.2	9.1	8.1	5.1	6.4	5.3	5.6
男女	0.9
35	...	8.2	16.4	15.4	9.7	12.3	10.1	10.8
子 宮	...	5.1	8.2	4.1	8.9	6.1	6.8	6.7
36	...	9.8	8.2	4.1	8.9	6.1	6.8	6.7
白 血 病	...	3.4	3.5	2.5	4.2	2.5	3.5	2.8
男女	...	3.5	4.6	3.6	4.4	1.5	3.7	2.2
37	...	3.3	2.5	1.6	4.1	3.4	3.4	3.4
そ の 他	...	37.4	43.3	56.5	55.1	42.6	52.2	51.6
男女	...	46.9	44.8	61.4	63.1	41.5	66.4	70.4
39	...	28.6	41.9	52.0	47.8	43.6	39.2	34.3
糖 尿 病	7.4	6.8	8.7	5.1	8.1	5.7	7.8	8.1
男女	...	8.8	11.0	3.6	6.2	6.7	8.1	6.6
46, 51-52, 54-56	...	4.9	6.6	6.5	9.7	4.8	7.4	9.4
心 疾 患	77.7	97.3	105.6	108.3	107.3	99.3	115.4	103.5
男女	...	109.7	114.3	120.2	117.3	116.4	126.2	114.5
51, 52	...	85.8	97.9	97.5	98.1	83.7	105.5	93.5
虚 血 性 心 疾 患	...	34.4	33.3	28.9	34.3	27.3	34.9	30.5
男女	...	47.8	39.3	39.2	40.9	34.8	35.4	35.2
46, 54	...	22.1	28.0	19.5	28.4	20.4	34.5	26.2
慢性リウマチ性心疾患及び心 内臓の慢性疾患	...	3.4	6.9	3.4	3.4	4.3	4.9	6.7
男女	...	0.9	4.6	2.7	2.7	3.7	4.4	8.8
...	...	5.7	9.0	4.1	4.1	4.8	5.4	4.7

注: 1) 総数は、年齢不詳を含む。

2) 昭和55年については、市町村別集計において男女別の集計をしていないので不明とした。

3) 平成6年以前は、死因について「简单分類番号」を使用している。

简单分類番号・死因・性	昭和55年	60	平成元年	2	3	4	5	6
48, 49 高血圧性疾患	7.4	5.5	6.5	3.8	3.0	5.0	2.5	3.9
男女	...	1.8	7.3	3.6	1.8	3.7	2.2	4.4
男女	...	9.0	5.8	4.1	4.1	6.1	2.7	3.4
48 高血圧性心疾患	...	3.0	4.8	3.0	1.7	3.9	1.8	2.8
男女	...	1.8	5.5	3.6	1.8	3.7	1.5	3.7
男女	...	4.1	4.1	2.4	1.6	4.1	2.0	2.0
58-60 脳血管疾患	103.4	88.8	81.8	67.1	85.6	89.8	91.4	82.8
男女	...	91.1	77.7	65.0	87.1	82.3	98.1	70.4
男女	...	86.6	85.5	69.1	84.3	96.6	85.2	94.2
62, 63, 66 肺炎及び気管支炎	34.9	38.6	46.3	60.3	57.2	50.7	74.5	68.8
男女	...	48.7	55.8	73.0	66.6	64.5	86.3	74.8
男女	...	29.4	37.8	48.7	48.7	38.1	63.6	63.3
63 肺炎	...	36.5	45.0	58.2	53.8	48.6	70.2	66.7
男女	...	46.0	54.9	71.2	63.1	60.0	82.6	71.2
男女	...	27.8	36.2	46.3	45.4	38.1	58.8	62.6
69 胃及び十二指腸潰瘍	...	4.2	3.0	3.0	0.8	2.1	4.2	2.8
男女	...	5.3	3.7	1.8	0.9	3.0	3.7	2.9
男女	...	3.3	2.5	4.1	0.8	1.4	4.7	2.7
73 慢性肝疾患及び肝硬変	8.3	6.8	10.4	7.6	8.1	6.7	7.1	8.1
男女	...	12.4	16.5	11.6	8.9	11.1	10.3	13.2
男女	...	1.6	4.9	4.1	7.3	2.7	4.1	3.4
76, 77 腎炎ネフローゼ症候群及びネフローゼ	5.2	5.9	14.7	12.3	14.0	16.3	16.9	14.0
男女	...	2.7	18.3	9.8	16.9	17.8	19.2	14.7
男女	...	9.0	11.5	14.6	11.4	15.0	14.9	13.5
88 精神病の記載のない老衰	7.9	6.8	6.5	7.2	5.1	4.6	7.8	5.6
男女	...	3.5	1.8	4.5	4.4	2.2	5.2	5.1
男女	...	9.8	10.7	9.7	5.7	6.8	10.1	6.1
E104-E114 不慮の事故及び有害作用	18.8	15.7	19.9	25.5	22.5	22.0	27.2	25.3
男女	...	24.8	30.2	35.6	36.4	32.6	41.3	36.0
男女	...	7.4	10.7	16.2	9.7	12.3	14.2	15.5
E104 自動車事故	...	5.1	7.4	11.9	11.9	10.3	15.5	9.5
男女	...	8.0	11.9	16.0	19.5	14.1	25.8	13.9
男女	...	2.5	3.3	8.1	4.9	6.8	6.1	5.4
E105 自動車事故以外の交通事故	...	0.8	0.9	1.7	...	1.8
男女	...	1.8	1.8	3.6	...	2.2
男女	1.4
E108 火災及び火焰による不慮の事故	...	0.8	...	0.4	1.3	0.7	1.1	1.8
男女	...	0.9	...	0.9	1.8	0.7	0.7	1.5
男女	...	0.8	...	-	0.8	0.7	1.4	2.0
E110 不慮の溺死	...	3.0	0.9	1.3	3.0	2.1	2.1	1.1
男女	...	5.3	1.8	0.9	4.4	3.7	3.7	2.2
男女	...	0.8	...	1.6	1.6	0.7	0.7	...
E115 自殺	16.6	20.8	15.6	15.3	17.4	14.9	12.7	14.4
男女	...	24.8	23.8	18.7	22.2	21.5	17.0	19.1
男女	...	17.2	8.2	12.2	13.0	8.8	8.8	10.1