



市政記者クラブ加盟社 各位

## 感染性胃腸炎の集団発生について

次の施設において、「感染性胃腸炎」の集団発生事例がありましたのでお知らせします。

### 1 施設等

盛岡市内の高齢者施設（利用者：20名程度、職員：20名程度）

### 2 患者の状況等

- (1) 1月6日（金）に施設から、複数の利用者及び職員が嘔吐、下痢等の症状を呈している旨の報告。
- (2) 保健所が調査を実施し、1月2日（月）から1月10日（火）までに20名（利用者12名、職員8名）に嘔吐・下痢等の症状があったことを確認。
- (3) 入院者及び重症者はなく、有症者は回復または回復傾向。

### 3 原因究明の調査等

- (1) 保健所が1月12日（木）に有症者6名に実施した糞便検査の結果、6名からノロウイルスを検出。
- (2) 保健所において感染経路等を調査したところ、嘔吐物・排泄物処理の過程及び環境面の消毒に一部不十分な点があったと推察されたことから、施設に対し手洗いの徹底と消毒の徹底等二次感染予防対策について指導。
- (3) 給食を原因とする食中毒の可能性は低いと判断。

### 4 保健所からのお願い

感染性胃腸炎は、例年、秋から冬にかけて流行します。

社会福祉施設はもちろん、各家庭においても、調理や食事の前、トイレやオムツ交換の後の手洗い等を心がけ、感染予防に注意しましょう。また、環境面の消毒にアルコール消毒液や次亜塩素酸水等が使用されている例がありますので、改めて塩素系漂白剤による消毒を適正な濃度で使用するをお勧めします。特に施設においては、早めの対策を心がけ、感染拡大を防ぐように努めましょう。

#### (1) ノロウイルスとは

ノロウイルスとは、嘔気・嘔吐と下痢を主症状とする急性胃腸炎の原因のウイルスのひとつです。ウイルスが体に取り込まれてから半日から2日の潜伏期間を経て、嘔吐が始まります。その後、水様性下痢が出現し、2日ほどの経過で回復に向かいます。症状がなくなっても2～3週間程度は便中にウイルスが排出されるといわれています。

#### (2) 予防方法

- ・ トイレやオムツ交換の後、調理前、食事前には石けんと流水で十分な手洗いを行う。
- ・ 下痢や嘔吐等の症状がある方は、食品を直接取り扱う作業を自粛する。
- ・ 調理する場合、加熱が必要な食品は85～90度・90秒以上で十分加熱する。
- ・ 嘔吐した場合は、部屋の換気を十分に行いながら、マスクや使い捨て手袋を用いて片付け、嘔吐した場所や使用した器具を塩素系漂白剤で消毒する。
- ・ 嘔吐、下痢等の症状がある場合には、早めに医療機関を受診する。

#### (3) 感染性胃腸炎の集団発生状況

区分	盛岡市				岩手県（盛岡市含む。）			
	ノロウイルス	ロタウイルス	その他（サポウイルス等）	計	ノロウイルス	ロタウイルス	その他（サポウイルス等）	計
令和4年4月～現在	1	0	1	2	18	0	24	42
昨年同期（令和3年度）	2	0	0	2	31	0	1	32

【担当：指導予防課長 猿舘 賢治 電話：019-603-8244】