



市政記者クラブ加盟社 各位

## 感染性胃腸炎の集団発生について

次の施設において、「感染性胃腸炎」の集団発生事例（1件）がありましたのでお知らせします。

### 1 盛岡市内の教育・保育施設（利用者・職員 100名以上）

#### (1) 患者の状況等

ア 5月23日（火）に施設から、複数の利用者が嘔吐、下痢等の症状を呈している旨の報告。

イ 保健所が調査を実施し、5月15日（月）から5月23日（火）までに12名（利用者12名）に嘔吐・下痢等の症状があったことを確認。

ウ 有症者は回復または回復傾向。

#### (2) 原因究明の調査等

ア 保健所が5月26日（金）に有症者8名に実施した糞便検査の結果、7名からアストロウイルスを検出。

イ 保健所において感染経路等を調査したところ、排泄物処理の手洗いや手順に一部不十分な点があったと推察されたことから、施設に対し再度手洗いの徹底と排泄物処理の手順の確認等二次感染予防対策について指導。

ウ 給食を原因とする食中毒の可能性は低いと判断。

### 2 保健所からのお願い

盛岡市内における感染性胃腸炎の定点医療機関当たりの報告数は、2023年第20週（5月15日から5月21日まで）に13.14人となり、前週（8.71人）よりも増加しています。社会福祉施設はもちろん、各家庭においても、調理や食事の前、トイレやオムツ交換の後の手洗い等を心がけ、感染予防に引き続き注意しましょう。

#### (1) アストロウイルスとは

アストロウイルスとは、嘔気・嘔吐と下痢を主症状とする急性胃腸炎の原因のウイルスのひとつです。ウイルスが体に取り込まれてから1日から4日の潜伏期間を経て、症状が出現し、4～5日ほどの経過で回復に向かいます。

#### (2) 予防方法

- ・ トイレやオムツ交換の後、調理前、食事前には石けんと流水で十分な手洗いを行う。
- ・ 下痢や嘔吐等の症状がある方は、食品を直接取り扱う作業を自粛する。
- ・ 調理する場合、加熱が必要な食品は85～90度・90秒以上で十分加熱する。
- ・ 嘔吐した場合は、部屋の換気を十分に行いながら、マスクや使い捨て手袋を用いて片付け、嘔吐した場所や使用した器具を塩素系漂白剤で消毒する。
- ・ 嘔吐、下痢等の症状がある場合には、早めに医療機関を受診する。

#### (3) 感染性胃腸炎の集団発生状況

区分	盛 岡 市				岩 手 県（盛岡市含む。）			
	ノロウイルス	ロタウイルス	その他（サポウイルス等）	計	ノロウイルス	ロタウイルス	その他（サポウイルス等）	計
令和5年4月～現在	4	0	1	5	8	0	2	10
昨年同期（令和4年度）	0	0	1	1	3	0	12	15